

Die Lumbal-Anaesthesie.

Ihre Entwicklung, ihre Vorteile und Nachteile.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

H o h e n M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t

der

**Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
zu Bonn.**

Vorgelegt am 10. Februar 1937

von

Raymond Rivkin

aus Brooklyn, New York

U. S. A.

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Graff.

Korreferent: Prof. Dr. Freiherr v. Redwitz.



Ohne die Experimentalarbeit von Chemikern und Pharmakologen hätte sich die L.A. nicht in dem Maße entwickeln können, wie sie es bis heute getan hat. Man untersuchte die Eigenschaften der Coca-Pflanze und kam dabei zu einer neuen Art der Analgesie. 1855 isolierte G a e d e k e das Alkaloid Cocain. Bis 1879 wußte man von dieser Droge sehr wenig; in diesem Jahre nun erforchte v o n A n r e p die sensorischen Wirkungen des Cocains auf die Haut. 1884 erprobte K ö l l e r an sich selbst die Wirkungen des Cocains auf die Zunge und kam zu der Annahme, daß eine ähnliche Analgesie bewirkt werden könnte, wenn man das Cocain in die Conjunctiva einträufelte. Seine Ergebnisse verursachten eine Sensation in der ophtalmologischen Chirurgie. 1885 injizierte O. W. M o o r e Cocain in seinen Arm und beschrieb die eintretenden analgetischen Wirkungen.

Die Pionierarbeit auf dem Gebiet der L.A. hat im Jahre 1885 L e o n a r d C o r n i n g ¹⁷⁾ geleistet. Er meinte, daß es nicht nötig sei, das Cocain in unmittelbare Berührung mit dem Rückenmark zu bringen und vertrat den Standpunkt, daß eine lokal eingeführte Droge nur auf dem Wege der Blutgefäße auf die Nerven wirke. Die unmittelbarste Art, die Lösung mit dem Rückenmark in Berührung zu bringen, war seiner Meinung nach diejenige auf dem Wege des Kreislaufs um das Rückenmark herum. Die von ihm angewandte Droge war Cocain-Hydrochlorid. Das Einführen einer Nadel zwischen den Membranen der Medulla Spinalis sei nicht durchführbar, so meint er, ohne die Entfernung der Wirbelbögen (er befürchtete nl. eine Verletzung des Rückenmarks). Er injizierte zwischen den Processus Spinosus der unteren dorsalen Vertebrae, weil zahlreiche kleine Gefäße (venae spinosae) zwischen diesen hindurchlaufen, dann in den Rückenmarkskanal eintreten und sich schließlich mit den größeren Gefäßen des Plexus spinalis verbinden. C o r n i n g kam zu der Überlegung, daß das Anaesthetikum wahrscheinlich rasch von den kleinen Restchen der genannten Gefäße

absorbiert und von dort durch das Blut zu der Substanz des Rückenmarks getragen würde, wenn man die Droge zwischen die Processus Spinosus der Vertebrae spritzte. Man folgte seinem Beispiel nicht, weil das Cocain an sich ein viel zu gefährliches Mittel ist. Man hörte nichts mehr von seiner Anaesthese, vielleicht weil Corning nicht Chirurg, sondern Neurologe war und weil er seine ersten Versuche nicht weiterführte.

Mit der Einführung der Quincke'schen ⁵⁸⁾ Lumbalpunktion im Jahre 1891 wurden weitere Möglichkeiten eröffnet. 1898 führte Bier ^{7,7a)} die heutige Methode der Injektion in den Subarachnoidalraum ein, ohne zu wissen, daß Corning schon auf demselben Gebiet gearbeitet hatte. Ich bin der Ansicht, daß man Bier als den Vater dieser Form der Anaesthese anerkennen muß; diese Ansicht vertreten alle Chirurgen, da Corning tatsächlich nur die Behandlung von Rückenmarksleiden vorhatte und diese Art der Anaesthese für die Chirurgie nur vorgeschlagen hat. Ausgehend von Beobachtungen an Tieren, ging Bier dazu über, die Wirkungen auf Menschen festzustellen. Er brachte seine Patienten in die Seitenlage und wandte die Quincke'sche Lumbalpunktionstechnik an. Dann wurde die gewünschte Menge Cocain (0,005) injiziert. Sechs Patienten wurden unter dieser Art von Anaesthese operiert. Es zeigte sich, daß es möglich war, große Teile des Körpers unempfindlich zu machen und innerhalb dieser Gebiete schmerzlose, große Operationen auszuführen. Die Mehrzahl der operierten Patienten hatten schlimme Nachwirkungen wie allgemeines Unbehagen, Schweiß, Erbrechen, Kopfschmerzen. Diese waren, verglichen mit denen bei allgemeiner Narkose, viel schlimmer, weil sie so lange anhielten. Bevor Bier mit der neuen Methode weiterarbeitete, entschloß er sich, diese an sich selbst zu erproben. Hildebrand, Biers Assistent, stellte sich ebenfalls als Versuchsperson zur Verfügung. Der Versuch bei Bier war wegen technischer Fehler nicht befriedigend. — Anstatt sich unmittelbar nach der Injektion zu Bett zu legen, führten B. und H. weiter ihren Dienst aus, nahmen später eine kräftige Mahlzeit zu sich und rauchten mehrere Zigarren. Die Nachwirkungen, die sich bei den beiden Chirurgen einstellten, waren höchst unangenehme:

Erbrechen, Schwindel, schwere Kopfschmerzen. Jedoch verschwanden nach wenigen Tagen alle diese Symptome.

Nach diesem Versuch riet Bier zur Vorsicht in der Anwendung der L.A., da er das Cocain zu toxisch in seiner Wirkung fand. Wenn überhaupt, solle man es nur in ganz kleinen Dosen verwenden. Ein Jahr später hielt Bier es für richtiger, die Anwendung der L.A. bei Menschen nicht fortzusetzen, bis eine weniger toxische Substanz als Cocain gefunden würde. Das Prinzip der Methode aber ließ er nicht fallen. Bier beschränkte seine Operationen unter L.A. auf die unteren Extremitäten, obwohl er völlige Lähmung bis herauf zu den Brustwarzen erreichte.

Als Ergebnis von Biers Warnung wurde in Deutschland die Anwendung der L.A. fast ganz eingestellt. In Frankreich jedoch fuhren verschiedene Chirurgen unter der Führung Tuffiers⁷⁸⁾ in Paris fort, die Bier'sche Methode mit Cocain zu verwenden. In Amerika wurde die Methode von Bier mit Begeisterung aufgenommen und angewandt.

Tuffier berichtet, daß er 250 Fälle mit Hilfe dieser Anaesthetie operiert habe, darunter 142 in der Bauchhöhle. Er operierte am Magen, an den Nieren und weiblichen Genitalien. Das Alter der Patienten lag zwischen 10 und 79 Jahren. Jüngeren Kindern und hysterischen Patienten wurde diese Art der Anästhetie nicht verabreicht. Herzerkrankungen und Arteriosklerose waren nicht kontraindiziert. Tuffier erlebte einen Todesfall durch die Folgen einer Herzaffektion. In einem Fünftel der Fälle stellte sich Erbrechen ein ohne ernstere Wirkung. Migräneartige Kopfschmerzen verschwanden nach einigen Tagen. In einigen Fällen jedoch dauerten sie etwa eine Woche. Im Ganzen erachtete Tuffier diese Nachwirkungen nicht für so ernst, als daß man ihretwegen von der Anwendung der L.A. hätte absehen müssen.

Donitz¹⁴⁾, der Mitarbeiter von Bier, fand 1903, daß die Zugabe von Adrenalin zu Cocain die toxische Wirkung reduziere. Das Adrenalin wurde zusammen mit dem Cocain in den Lumbalsack eingespritzt. In allen Fällen trat eine sehr gute Anästhetie ein, ohne daß unangenehme Nebenwirkungen bedenklicher Art zu beobachten waren.

Auch Schwarz⁸⁵⁾ gehört zu den Pionieren der Bier'schen Methode. Er hielt diese nicht nur für ein theoretisch interessantes Experiment, sondern auch für ein praktisch wertvolles. Schwarz schlug vor, die Bier'sche Dosis von 0,15 g nicht zu überschreiten. Bei dieser Dosis sind bedrohliche Erscheinungen nicht zu befürchten. Er führte eine einfache Art ein, das Cocain zu sterilisieren: das Cocain wird in eben gekochtem sterilisiertem Wasser gelöst. Das Alter der von ihm Operierten lag zwischen 9 und 70 Jahren. Kontraindikation bietet Jugendalter bei allzu nervöser ängstlicher Erregbarkeit. Er beschränkte seine Operationen auf die unteren Extremitäten, auf Hernien- und Analoperationen und auf solche von Blasen-Vaginalfisteln. Bei Eingriffen in der Bauchhöhle machte er die Erfahrung, daß die Patienten heftige Schmerzen empfanden, die durch Manipulationen am entzündeten Bauchfell, an den Adnexen und durch das Umlegen und Vorziehen des Uterus bei der Exstirpation hervorgerufen wurden.

Nach den Erfolgen von Sonnenberg (vgl. S. 8) mit Stovain und von Schwarz mit Tropicocain, die eine geringe toxische Wirkung ausübten, ging Bier im Jahre 1906 wieder dazu über, seine eigene Methode anzuwenden. Zuerst verwandte er Stovain, dann Tropicocain, wovon er kleine Dosen (0,05 g) ohne Zusatz von Nebennierenpräparaten brauchte. Um die Anästhesie hoch hinaufzutreiben, löste er das Anästhetikum in viel Liquor (6—10 ccm). Unmittelbar nach der Injektion ließ er den Patienten in starke oder weniger starke Trendelenburg-Lage bringen, je nach der Tiefe der gewünschten Anästhesie. Er hielt es nicht für ratsam, höher als in der Nabelgegend zu operieren, obwohl er an die Möglichkeit einer Operation in den oberen Teilen des Körpers glaubte.

Die Nachwirkungen der Anästhesie nach der Bier'schen Methode mit Cocainhydrochloridlösung — allgemeines Unbehagen, Schweiß, Erbrechen, Kopfschmerzen —, die oft tagelang nach der Operation andauerten, waren trotz aller Vorichtsmaßnahmen nicht restlos zu vermeiden. Die Vorichtsmaßnahmen bestanden darin, daß man Halsbinden anlegte, von der Verwendung der Trendelenburg-Lage ablah und die Patienten Amylnitrit inhalieren ließ, um Gefäßerweiterung herbeizuführen. Das Ausmaß der beobachteten

Nebenwirkungen war derart, daß französische Autoren sie „Menigitis aseptica“ nannten.

Man bemühte sich also in erster Linie darum, eine weniger toxische Substanz als Ersatz für das Cocain zu finden. 1891 hatte Giesel das neue Alkaloid Tropacocain isoliert. Die physiologischen Eigenschaften wurden 1892 von Chadburne untersucht; er stellte fest, daß es weniger als halb so toxisch sei wie Cocain. Mit der Entdeckung des Stovains durch Fournier und die Untersuchung seiner Eigenschaften durch Ponchet bekam die Frage einen neuen Antrieb. Als Schwarz dafür eintrat, erprobten verschiedene deutsche Chirurgen das Tropacocain mit günstigen Ergebnissen. Dieses Alkaloid ist in Deutschland viel verwendet worden, während in Frankreich und England Stovain mehr in den Vordergrund trat. Im Jahre 1904 wurde von Einhorn das Novocain entdeckt und von Biberfeld *) am Pharmakologischen Institut der Universität Breslau erprobt. Das Mittel besitzt dieselbe Wirkung auf periphere sensible Nerven wie das Cocain. Auch Eucaïn wurde mit geringerem Erfolg erprobt. Wenn auch Schwarz immer noch eine wässrige Tropacocain-Lösung verwandte, so bedeutete seine Methode doch einen großen Fortschritt vor der Anwendung all dieser neuen Drogen. Obwohl bei Kozłowski⁴²⁾ in einem großen Prozentsatz der Fälle die üblichen Nachwirkungen sich einstellten, operierte er 16 Fälle unter L.A. Von diesen hatten 9 Erbrechen und Kopfschmerzen, bei den übrigen ergaben sich keinerlei Nebenwirkungen. Die Analgesie war eine vollständige. Kozłowski war der Ansicht, diese Nebenwirkungen seien nicht verursacht worden durch die giftigen Eigenschaften des Tropacocains, sondern durch die injizierte Flüssigkeit, welche auf mechanische oder chemische Weise die Rückenmarks- und Gehirnhäute reizen müsse. Es ist eine Tatsache, daß Wasser ein stark reizendes Medium ist. Er beschloß daher, das Tropacocain, gelöst in Cerebro-Spinal-Liquor, zu injizieren. Gleich nach dem ersten Fall, bei dem diese Methode angewandt wurde, stellte er eine entschiedene Verbesserung fest. Die Anästhesie trat rasch ein, und es ergaben sich keine Nebenwirkungen. Noch heute wird diese Methode angewandt. Sie besteht darin, daß man eine sterilisierte Glasschale nimmt, in welcher die

Droge in Puderform sich schon befindet. Die Punktion in den Subarachnoidealraum wird vorgenommen; dann läßt man den Liquor in die Schale tropfen. Dann vermischt man ihn und injiziert aufs neue.

Sonnenberg⁸⁸⁾ hatte Erfolg mit Stovain, welches in seiner Wirkung dem Cocain verwandt ist, aber chemisch zu einer gänzlich anderen Gruppe gehört. In 11 Fällen versagte die Injektion, höchst wahrscheinlich wegen eines technischen Fehlers. In den übrigen 46 Fällen war ein restloser Erfolg ohne Intoxikations Symptome zu verzeichnen. In verschiedenen Fällen erreichte Sonnenberg Anästhesie bis in die Halsgegend, einmal bis zum Gesicht und zur Stirn.

Stovain erfreute sich bei englischen Chirurgen großer Beliebtheit. Dean²¹⁾ fand diese Methode sehr nützlich bei Peritonitis. Der bekannte schlechte Einfluß, den dabei die Äthernarkose hat, wird dadurch vermieden. Der Puls wird bei der Verwendung von Stovain oft am Ende des Eingriffs besser, als er am Anfang war. Er beobachtete auch, daß in vielen Fällen bei Beginn der Analgesie eine reichliche Entleerung von Darmgasen und dünnem Kot auftrat, was für den Eingriff und für die postoperativen Ergebnisse einen entschiedenen Vorteil bedeutete.

Barker⁵⁾ war der Ansicht, daß das Spezifische Gewicht der Lösung eine wichtige Rolle spiele bei der Lokalisierung der Droge innerhalb des Dural-Kanals. Seine Lösung besteht aus 5 Teilen Stovain, 5 Teilen Glucose und 90 Teilen destillierten Wassers. Sie ist dem Blut isotonisch, ihr spezifisches Gewicht beträgt 1023, das des Cerebro-Spinal-Liquors 1007. Die Durchschnittsdosis von Stovain betrug 1 ccm der 5%igen Lösung. Drei Fälle starben bald nach der Dural-Injektion. Alle drei waren von Anfang an in einem schlechten Zustand. Zudem traten diese Todesfälle auf, als man die Grenzen der L.A. noch nicht restlos beherrschte; sie hätten sich wahrscheinlich bei jeder anderen Art von Anästhesie auch ereignet.

In der Richtung von Donitz arbeitete Sonnenberg weiter. Er machte Versuche mit reinem Stovain, mit Stovain-Adrenalin und Novocain-Adrenalin mit indifferenten Ergebnissen. Michelson⁴⁸⁾ meinte, daß bei gleichzeitiger subduraler Anwendung von Cocain und Adrenalin dieses keinerlei entgiftende

Wirkung auf das Cocain ausübe und daß der Vorteil der Anwendung von Adrenalin lediglich auf der Verdünnung des Anästhetikums beruhe. Er glaubte sogar, daß gerade Nebennierenpräparate eine der Ursachen für die unangenehmen Nebenwirkungen seien. Die Verlängerung der Dauer der Anästhesie durch die verlangsamte Resorption des Anästhetikums bedeutet keinen Vorteil. Michelson erzielte bessere Ergebnisse mit Tropacocain und Stovain, als er kein Adrenalin mehr zusetzte. Barker behauptet, daß Adrenalin oder sein synthetischer Ersatz eine Ischämie der Rückenmarkswurzeln verursache, die sehr gefährlich ist.

Im Jahre 1906 wurde die L.A. auch mit Novocain als Anästhetikum beliebt. Opitz hat 25 gynäkologische Operationen ausgeführt, bei denen die Anästhesie durch Novocain-Suprarenin erzeugt worden war. Darunter 16 Laparotomien mit großem Erfolg. Wie schon andere Autoren hebt auch Opitz hervor, daß man mit L.A. auch bei sehr heruntergekommenen und alten Leuten sehr schwierigen und langdauernden Karzinomoperationen durchführen könne. Sonnenberg berichtet von 82 Fällen, bei denen die Medullar-anästhesie mit Novocain ausgeführt wurde. Die Operationen waren folgende: Appendektomien, Amputation recti, Stenosis flexur, Sigm., Hydrozele, Gastrostomien, Kürettement u. Kolporhaphie, Hernia umbilicalis, Herniotomie, Adnexoperationen, Laparotomie bei Ileus, Cholelithiasis, Leberabzess, Enteroanastomose, Vaginale Total-exstirpation, Darmfistel, Operation am Damm und am Anus. Die Ergebnisse waren: vollkommene Anästhesie 76mal, unvollkommene 6mal; Nebenwirkungen während der Operation: Erbrechen 5mal, Kollaps leichter Art 4mal; Nachwirkungen: Erbrechen selten, Kopf- und Nackenschmerzen hin und wieder.

In England operierte Canny Ryall¹⁴⁾ eine 40jährige Frau wegen einer Wanderniere. Die Nephropexie wurde unter Novocain-L.A. vorgenommen und konnte mit Erfolg durchgeführt werden. Ryall ist der Ansicht, daß diese Methode von großem Wert ist bei Herz- und Gichtkranken, Alkoholikern, älteren Leuten und solchen, bei denen nach schwerer Operation der unteren Extremitäten, bei Prostataktomien, strangulierten Hernien usw. ein Schock zu befürchten ist. Bei Laparotomien wurde die Novocain-L.A. vorteilhaft kombiniert mit dem Morphin-Skopolamin-Dämmer Schlaf.

Von allen angewandten Drogen sind Tropacocain, Novocain, Neocain und Procain am beliebtesten geblieben und haben sich im Laufe der Zeit als zuverlässig erwiesen.

Während der letzten 6 oder 7 Jahre war man bestrebt, sich von der alten Methode zu entfernen, welche trotz der neuen Fortschritte von den meisten Chirurgen noch angewandt wird; die Methode nl., die mit dem Liquor gemischte Droge in den Arachnoidealraum einzuspritzen, wo sie sich mit dem übrigen Liquor in eine anästhetisierende Lösung verwandelt. Nach der jüngsten Entwicklung wendet man die Methoden von Pitkin mit Spino-cain, von Kirschner⁴¹⁾ mit feiner Anästhesie-Plombe und das neue hoch viskotische Pantocain „L“ an.

Pitkin⁵⁸⁾ machte sich als erster von der alten Methode frei. Das Wesentliche und Neue bei seinem Vorgehen bestand darin, daß das Anästhetikum in viskös gebundenem Zustand injiziert wurde und, vom Liquor durch das spezifische Gewicht unterschieden, in seiner Lage innerhalb des Rückenmarkskanals durch Höher- und Tieferstellen des Kopfes der auf dem Operationstisch liegenden Kranken nach dem Willen des Operators verändert werden konnte. Mit anderen Worten: es handelte sich um eine variable Anästhesie. Die I.G. Farbenindustrie, die sich von jeher mit der Herstellung von geeigneten Lumbalanästhesiepräparaten in gebrauchsfertigem Zustand befaßte, stellte ein neues „Hochviskotisches Pantocain L“ her. Unter den Autoren, welche dieses erfolgreich angewandt haben, sind Bode⁸⁾, Schmidt⁶⁴⁾, Killian⁴⁰⁾ und Flörcken²⁸⁾.

Eine Ampulle Pantocain „L“ enthält 3,75 ccm einer 0,8%igen viskösen Lösung = 0,03 Pantocain. Diese Menge ist aufgelöst in einem viskösen Speziallösungsmittel, bestehend aus Wasser, Oxaethylmethylcellulose und Äthylalkohol. Mit dem spezifischen Gewicht 1,0009 ist es spezifisch leichter als Liquor, dessen spezifisches Gewicht bei 37 Grad Celsius bei 1,003 bis 1,008 liegt. Die Anästhetikum-Plombe schwimmt auf dem Liquor wie die Luftblase in einer Wasserwaage. Bode schreibt „so daß bei der Anwendung im allgemeinen dieselben Vorschriften wie bei dem Leichtspinocain gelten, vor allem niemals bei aufrecht sitzenden Kranken sondern

nur in horizontaler Seitenlage das Mittel in den Lumballsack zu injizieren, um eine unerwünschte und nicht gefahrlose Einwirkung der Lösung in den höheren Regionen des Wirbelkanals zu vermeiden. Die Vorteile dieser Methode sind: 1. Die spezifische Gefährdung der Blutdrucksenkung wird weitgehendst vermieden. Die Blutdrucksenkung kann bei sorgfältiger Kontrolle und bei zweckmäßiger Auswahl der Fälle durch prophylaktische Bekämpfung mittels künstlicher Blutdruckstabilisierung und durch individuelle und fraktionierte Dosierung fast vollkommen vermieden werden. 2. Die Kontrollierbarkeit, Dosierbarkeit und Leistungssicherheit der Methode ist bedingt durch die viskositische Beschaffenheit und das niedrige spezifische Gewicht des Pantocains. Die Diffusion des Pantocains „L“ wird durch die Viskosität der Lösung weitgehend gehemmt und eine örtliche Fixierung im Lumballsack an die Nervensubstanz gefördert. 3. Die vollaussreichende Anästhesiedauer ist durch Pantocain „L“ gesichert. 4. Was das Instrumentarium angeht, so kann mit den üblichen Instrumentarien gearbeitet werden.

Sein großer Nachteil beruht jedoch darin, daß bei falscher Lagerung das Anästhetikum schon innerhalb 10 bis 15 Sekunden die Medulla oblongata erreicht.

Kirschner ⁴¹⁾ sagt in seiner Kritik der üblichen Methoden der L.A. „wir müssen verhindern, daß das anästhetisierende Mittel sich über große Abschnitte des Arachnoidealraumes ohne unseren Willen verbreitet, daß es sich mit großen Teilen des Liquors hemmungslos mischt und sich dort, wo es gebraucht wird, unbegrenzt bis zur Wirkungslosigkeit verdünnt. Wir müssen im Gegenteil unsere anästhetisierende Lösung zwingen, daß sie an einer eng begrenzten Stelle des Subduralraumes in konzentrierter Form verharrt“.

Kirchner glaubt, dieses Problem durch seine Anästhesie-Plombe gelöst zu haben. Er schreibt: „Die anästhetisierende Lösung daran zu verhindern, sich kopfwärts weiter als für das Operationsgebiet notwendig auszubreiten, ist einfach zu lösen. Wir brauchen nur eine anästhetisierende Lösung zu verwenden, die sich mit dem Liquor nicht mischt, die schwerer als Luft und leichter als der Liquor cerebro-spinalis ist, so daß sie sich vermöge ihres spezifischen Ge-

wichtiges zwischen die Luftblase und zwischen den Liquor einstellt, also auf dem Liquor schwimmt.“

Kirschners Plombe besteht aus:

Percain 0,125 g

Dextrin 0,90 g

Alkohol 100 % 11,60 g

aq. dest. gepuffert ad 100,00 ccm.

Diese Plombe besitzt ein spezifisches Gewicht von 986,65.

Da die Menge der eingefüllten Luft von ausschlaggebender Bedeutung für die richtige Lage der Anästhesieplombe ist, so muß die Luftfüllung mit großer Sorgfalt durchgeführt werden. Die Abdichtung zwischen dem Stempel und dem Zylinder einer gewöhnlichen Rekordspritze oder zwischen einer Punktionskanüle und einer Rekordspritze ist bei diesem Verfahren unzureichend. Kirschner hat ein Instrument bauen lassen: ein System von Spritzen: eine völlig luftdicht abgeschlossene Doppelspritze, die es möglich macht, daß Liquorentnahme, Liquoreinfüllung, Lufteinfüllung, Luftentnahme und Plombeneinfüllung in jedem Augenblick abwechselnd betätigt werden können.

Kirschner berichtet weiter (S. 351): „Reicht die Anästhesie bei einer Sensibilitätsprüfung zu weit kopfwärts, — es kann das bei anormal engem Durallack sogar nach der ersten Luftfüllung vorkommen — so wird eine entsprechende Menge Luft durch Zurückdrehen des Stempels der Luftspritze wieder aus dem Durallack zurückgefaugt, und die Plombe wird wieder ein Stück steißwärts in den Bereich der Brustwirbel verlagert. Der Kleinspritzenhahn wird wieder umgestellt, und die Lage des Anästhesiegürtels wird nach drei Minuten erneut bestimmt und, wenn nötig, durch Nachfüllen oder Absaugen von Luft reguliert.

„Die L.A. wird auf dem Operationstische selbst ausgeführt, eine Umlagerung des Kranken auf einen anderen Tisch vor der Operation ist unzulässig. Der in Seitenlage befindliche Kranke wird mit der Längsachse des Körpers in einen Winkel von 25 Grad zur Horizontalen, Kopf tief und Steiß hoch gelagert. An dem Operationstisch befindet sich ein Winkelpendel oder an seiner Drehachse eine Winkelskala, wo der Grad der Schräglagerung genau abzu-

leben ist. Die Schräglagerung von 25 Grad muß während der Herstellung der L.A., während der Operation und danach bis zum Verschwinden der Anästhesie unverändert beibehalten werden. Ein besonderer Assistent ist dafür verantwortlich.“

Mortalität bei der L.A.

Es ist manchmal, sogar nach der Sektion, nicht möglich, die Todesursache zu bestimmen. Wie ist es dann möglich, die Todesursache festzustellen, wo nicht einmal eine Sektion stattgefunden hat? Einige der Todesfälle bei Operationen unter L.A. sind dieser Art von Anästhesie zuzuschreiben, bei einer großen Zahl hingegen besteht kein Zusammenhang damit. Blesse sen⁹⁾ und Rygh veröffentlichten eine aus der neuesten Literatur gesammelte Liste von 215 895 Fällen, in denen unter L.A. operiert wurde und wobei sich ein Gesamt von 75 Todesfällen, also eine Mortalitätsziffer von 1 zu 3345 ergab. Bei 44 241 von diesen Operationen gab es 29 Todesfälle, für welche ein einigermaßen befriedigender Grund angegeben werden konnte. Bei näherer Betrachtung dieser 29 Todesfälle kam man zu der Feststellung, daß nur 4 von den 29 dem Anästhetikum zur Last gelegt werden konnten. Die anderen 25 Fälle waren entweder moribund vor der Operation oder die Patienten starben 12, 14, 16 bis 20 Stunden nach der Operation nicht auf Grund des Anästhetikums, sondern infolge der pathologischen Läsion, wegen welcher sie operiert wurden. Einer der 25, ein starker, gesunder Mann, starb nach der Spinalpunktion, bevor irgendein Anästhetikum injiziert worden war. Die entsprechend korrigierte Mortalitätsziffer beträgt 4 auf 44 241, also 1 zu 11 060. Sogar bei diesen 4 Todesfällen besteht die Möglichkeit, daß sorgfältige Sektion eine andere Ursache gezeigt hätte.

Beim Vergleich der Mortalitätsziffer bei L.A. mit der irgend einer andern Art von A. muß man sich vergegenwärtigen, daß die Statistik über Todesfälle bei L.A. subjektiven Erfahrungen derer entspricht, die sie angewandt haben. Wenn L.A. nicht als Routine angewandt wird, bevorzugt man sie in solchen Fällen, wo eine andere Art von Narkose kontraindiziert wäre. In einigen dieser Fälle ist es sehr wahrscheinlich, daß die Operation unter einer

anderen Form von Narkose nicht hätte vorgenommen werden können. Man riskierte die Operation nur, weil man glaubte, daß die L.A. eine erhöhte Sicherheitsgrenze mit sich bringe.

Todesfälle bei Operationen unter L.A. sind meistens dramatisch, ereignen sich kurz nach dem Einführen des Anästhetikums in den Subarachnoidealraum, während bei Inhalations-A. der Tod nicht eintritt, bevor eine beträchtliche Zeit nach Beendigung der Operation verstrichen ist. McGrath⁴⁷⁾ von der Mayo Clinic berichtet von 49 057 Ätheranwendungen ohne Todesfälle, die lediglich dem Anästhetikum zuzuschreiben waren. Aus derselben Klinik, wenn auch über einen anderen Zeitraum, berichtet Lundy⁴⁸⁾ von 21 Todesfällen bei 600 Operationen; 6 davon wurden, seiner Meinung nach, teilweise durch die Äthernarkose verursacht. Wir nennen diese Zahlen, um zu zeigen, wie irreführend die Statistik sein kann. Bei einer verhältnismäßig großen Anzahl von Fällen, in welchen unter Inhalationsnarkose operiert wurde und welche tödlichen Ausgang hatten, wird als Todesursache angegeben: Urämie, Gefäßkollaps, Pneumonie, Sepsis, Myocarditis usw. Solche Todesfälle sind nicht dem Anästhetikum zur Last zu legen, da der Patient den operativen Eingriff überlebt und erst nach Verlauf einer gewissen Zeit stirbt.

Koster und Kasman⁴⁹⁾ haben die offensichtliche Ungeheimtheit im Hinblick auf die Beziehung zwischen Atemlähmung und L.A. erkannt. Man weiß jetzt, daß die Gefahr der Atemlähmung infolge der Wirkung der Droge auf die Medulla durch Diffusion nach oben, unbedeutend ist. Es sind Fälle berichtet worden, bei denen bis zu 1200 mg Novocain in den Subarachnoidealraum injiziert wurden ohne irgendwelche Folgen.⁵¹⁾ Es ist kaum zu verstehen, wie das Anästhetikum bei Anwendung einer Durchschnittsdosis von 100 bis 150 mg sich aufwärts bis zur Medulla verteilen kann in einer Konzentration, die genügen würde, Atemlähmung hervorzurufen, wenn unter ähnlichen Umständen die Anwendung einer zehnfachen Menge des Anästhetikums — wobei die Diffusion zehnmal so stark sein muß — gut verlaufen ist. Es muß also nach einer anderen Erklärung für diese Art von Todesfällen bei Operationen unter L.A. gefacht werden.

Foss und Schwal m²⁹⁾ haben 2000 Fälle unter L.A. verglichen mit der gleichen Anzahl unter Äthernarkose. Die Operationen fanden nacheinander ohne besondere vorherige Auswahl statt und wurden alle an Organen unterhalb des Zwerchfells ausgeführt. Die Erkrankungsarten, die operiert wurden, waren etwa gleichmäßig auf die beiden Methoden der Anästhesie verteilt. Die Mortalitätsziffer bei L.A. betrug 7% (140 Todesfälle), darunter einer im Operationsaal. Bei Äthernarkose 137 Todesfälle (6,85%), wovon 10 im Operationsaal.

Sisse⁶⁷⁾ berichtet von 4 Todesfällen unter 1875 Operationen, die auf dem Operationstisch innerhalb einer Stunde nach der Injektion des Spinalanästhetikums eintraten, weist aber darauf hin, daß sich auch bei der Verwendung der Inhalationsnarkose verschiedentlich plötzliche Todesfälle ereignet haben.

Bower¹⁰⁾ und seine Mitarbeiter behaupten, daß der Tod eines Patienten, dessen Blutdruck um 50% oder mehr sinkt oder bei dem sich Atembeschwerden einstellen innerhalb 20 Minuten nach der Injektion, dessen Blutdruck ferner vor Ablauf der Operation nicht wieder ansteigt auf mindestens 25% des normalen und der infolgedessen einen sekundären Schock erleidet, als durch die Anästhesie verursacht anzusehen ist, gleichviel, ob er schon auf dem Operationstisch oder erst im Krankenzimmer stirbt.

Philipowicz⁵⁵⁾ hatte 2 Todesfälle unter 5000 Operationen. Diese beiden ereigneten sich rasch hintereinander nach einer Serie von 4000 Operationen unter L.A. ohne einen einzigen Todesfall. Beide Male hatten die Patienten Ileus und mangelhafte Zirkulation, so daß eher die Notwendigkeit der Operation selber als die Anästhesie als Todesursache angesehen werden könnte. Ph. hält die L.A. für die Methode der Wahl für Operationen unterhalb des Diaphragmas und oberhalb des Umbilicus.

Deaver und Eckels²²⁾ berichten von zwei Todesfällen unter 3202 Operationen mit L.A. Einen davon legen sie unmittelbar der Anästhesie zur Last, den anderen operativem Schock eines fast moribunden Patienten.

Tendler⁷⁴⁾ legt eine Aufstellung von 326 910 Operationen unter L.A. vor, darunter 80 Todesfälle. Diese Aufstellung umfaßt

eine große Verschiedenartigkeit der Technik und der angewandten Drogen. Sie enthält ferner eine 1926 von Jonnesco berichtete Serie von 6200 Fällen, 600 Fälle von Rostock (1920), 2000 von Goffet und Mounod, 1100 von Case, 1065 von Bainbridge und 1000 von Labat — alle ohne einen einzigen Todesfall. Tendler schreibt in dem Kommentar seiner Aufstellung: „Alle Fälle einbegriffen finden wir in dieser Serie eine Mortalitätsziffer von 1 zu 4086. Wenn wir diese Todesfälle kritisch betrachten, erkennen wir, daß die überwiegende Anzahl sich ereignete, wo der nahende Tod offensichtlich und, ganz gleich welche Anästhesie angewandt worden wäre, unvermeidlich war. In nur 9 oder 10 Fällen waren die Umstände derart, daß wir den Tod der L.A. zuschreiben könnten.“

B a b c o c k *) schreibt, daß er bis 1914 bei 6000 Operationen unter L.A. 12 Todesfälle erlebte, die während der Narkose eintraten. Fast alle diese 12 Patienten befanden sich in hoffnungslosem Zustand und wären wahrscheinlich bei jeder Art von Anästhesie gestorben. Während der folgenden zehn Jahre, als B. die L.A. nicht bei hoffnungslosen Patienten anwandte und die Technik verbessert wurde, führte er 6000 Operationen ohne Todesfall aus. Babcock schreibt weiter: „Die Wirkung der wenigen Centigramm Droge auf die parenchymatösen Zellen des Körpers ist kaum bemerkbar. Gehirn, Leber, Niere und Lungen sind so gut wie frei von toxischer Einwirkung durch das Anästhetikum. Auf keine andere Art kann eine so tiefe und umfassende Anästhesie mit Hilfe einer so geringen Dosis einer Droge und mit einer so geringen allgemeinen toxischen Wirkung erreicht werden. Bei keiner anderen Methode stellt sich die unangenehme Wirkung des Anästhetikums in den frühen Stadien der Operation ein, wenn der Patient sie am besten aushalten kann. Bei richtiger Anwendung hat kein Anästhetikum des gleichen Wirkungsbereiches so wenig Folgen.“

Komplikationen.

Blutdruck

Das Sinken des Blutdrucks braucht den Narkotiseur oder den Chirurgen nicht zu beunruhigen. Wenn geeignete Vorichtsmaßnahmen getroffen werden, dürfte von dieser Seite nichts zu befürchten sein.

Während der ersten 500 Fälle unter L.A. wurde bei K o f f e r ⁴³⁾ die Blutdruckskurve genau aufgezeichnet; dabei waren erstaunlich viele Variationen zu beobachten. Es ließ sich nicht vorherlagen, was nach der Injektion mit dem Blutdruck geschehen würde. Manchmal ergab sich kaum eine Veränderung; dann wieder zeigte sich ein maximales Absinken von 8 bis 10 mm Hg. In einer großen Anzahl von Fällen beobachtete man ein Sinken von 20 bis 30 mm Hg innerhalb von zehn Minuten nach der Injektion, das ungefähr $\frac{3}{4}$ Stunde lang anhielt. Das Wiedereintreten des normalen Blutdrucks geht der Rückkehr des Empfindungsvermögens unmittelbar voraus. In einigen anderen Fällen wiederum sank der Blutdruck 50 bis 70 mm Hg innerhalb von zehn Minuten nach der Injektion und kehrte in weiteren zehn Minuten bis auf 20 mm Hg des normalen zurück. Bei mindestens 5 % der Fälle sank der Blutdruck während der ersten zehn Minuten auf einen so niedrigen Grad, daß der Radialpuls nicht mehr fühlbar war und der Blutdruck nicht mehr gemessen werden konnte. Zuerst rief dies große Beunruhigung hervor; man griff zu allen möglichen Arten von Stimulantien: intravenös verabreichtem Adrenalin, Coffein, Strychnin usw. Schließlich kam man zu der Einsicht, daß mit oder ohne diese stimulierenden Mittel der Blutdruck zurückkehrte, wenn der Patient in die Trendelenburg-Lage gebracht würde. In einigen Fällen, bei denen sich der Blutdruck nicht messen ließ, weil er zu niedrig war, konnte der Herzschlag ohne weiteres durch das Diaphragma gefühlt werden. Es lag dann kein Herzkollaps, sondern ein vasculärer vor.

Nach Koffert läßt sich dies erklären. Jedes Organ im Körper erfordert, wenn es in gesteigerter Aktivität ist, erhöhte Blutzufuhr.

Um diese herbeizuführen, muß Blut von inaktiven in aktive Gewebe strömen. Wenn man das Rückenmark in der Höhe des Ursprungs des 1. Dorsalnervs durchschneidet, sinkt der Blutdruck erheblich, obwohl eine Beschleunigung des Herzschlags eintritt. Das Sinken muß verursacht sein durch eine Veränderung, die sich auf die Blutgefäße auswirkt. Legt man den Schnitt in der Höhe des 6. Dorsalnervs, so ist das Sinken fast ebenso groß. Reizen des peripheren Endes des durchschnittenen Rückenmarks bewirkt eine allgemeine Vasokonstriktion und ein entsprechendes Ansteigen des Blutdrucks.

Das starke Sinken, das bei Durchschneidung des Rückenmarks in der Höhe des 1. Dorsalsegments zu beobachten ist, hält nicht an. Nach wenigen Stunden beginnt der Druck zu steigen und erreicht schließlich einen Grad, der fast ebenso hoch ist wie vor der Durchschneidung. Wenn das Rückenmark eines Tieres zerstört ist, sinkt der Blutdruck auf Null und die Zirkulation hört auf. Es muß daher im Rückenmark zusätzliche vasomotorische Zentren geben.

Da diese Anästhesie die unteren dorsalen Wurzeln teilweise, wenn nicht ganz, angreift, werden die Splanchnicus-Reize unterbrochen. Der vollkommene Verlust all dieser Reize kann casculare Entspannung der abdominalen Gefäße herbeiführen, welche genügen, das gesamte Blut des Körpers aufzunehmen. Das Gehirn fordert immer eine normale Blutzufuhr; bei einer so starken Splanchnicus-Vasodilatation kann eine ausreichende Blutzufuhr zum Gehirn nur durch „gravity drainage“ zum Herzen aufrechterhalten werden. Dies erreicht man mit Hilfe der Trendelenburg-Lage. Unterläßt man ihre Anwendung, so stellt sich zum Tode führende Bulbar- und Cerebralanämie ein, die nicht durch Herzlähmung verursacht wird, sondern durch das Fehlen einer genügenden Menge Blut, die das Herz zum Gehirn schicken kann. Wenn die Trendelenburg-Lage angewandt wird, macht es nichts aus, wie stark der Blutdruck sinkt. Trotz der Tatsache, daß die Literatur wieder und wieder Hypotension als Kontraindikation bei L.A. nennt, behauptet Koster, daß niedriger Blutdruck kein Hindernis bedeute.

In ihrem Aufsatz berichten K o s t e r und S c h e i n f e l d ^{43d)} von 69 erfolgreichen Operationen an Frauen wegen ruptierter

Tubarschwangerschaft. Alle erhielten L.A. ohne Berücksichtigung der Höhe des Blutdrucks. In zwei von diesen Fällen konnten keine sphygmomanometrische Messungen abgelesen werden. Trotz Behandlung gegen Schock und Blutverlust stieg der Blutdruck nie über 55 mm Hg. Sie kamen zu dem Schluß, daß extrauterine Schwangerschaft mit ihrem Schock- und Kollapszustand nicht kontraindiziert ist für diese Art der Anästhesie.

Morri^{son} ⁴⁹⁾ hat die Erfahrung gemacht, daß akuter Blutverlust sich nicht nachteilig auswirkt. Er operierte zwei Fälle von ruptierter extrauteriner Schwangerschaft mit schwerer Blutung, die beide in jeder Hinsicht gut verliefen.

Dies ist sehr bemerkenswert, da Schock- und Kollapszustände gewöhnlich als Kontraindikation bei L.A. angesehen werden. In der Broschüre von Bayer (I.G. Farben) über das Pantocain wird behauptet, daß bei allen Patienten mit Schock- und Kollapszustand bei unbeeinflussbar niedrigem Blutdruck die L.A. kontraindiziert sei.

Wright ⁵¹⁾ hält L.A. für „einen wahren Lebensretter“ in gewissen Fällen, so bei Operationen, die eine starke Schockwirkung mit sich bringen.

Ephedrin, Epinephrin, Ephetonin, Benzedrin usw. sind einige der hypertensiven Drogen, die zur Stabilisierung des Blutdrucks angewandt werden. Ob diese Drogen wirklich nützlich sind, bleibt eine offene Frage, besonders, wenn man Kofsters Aufsätze gelesen hat. Labat ⁴⁴⁾ wendet sich gegen die Verwendung von hypertensiven Drogen. Wie Koster glaubt auch er, daß die Trendelenburg-Lage ausreicht, den Blutdruck zu stabilisieren.

In der Kirschner'schen Klinik ⁴¹⁾ gab man jedem Patienten 20 Minuten vor der Operation 0,05 Ephetonin zur Stabilisierung des Blutdrucks. In 50% einer Serie von 220 Operationen (ausschließlich im Oberbauch) veränderte sich der Blutdruck nicht. In 9% dieser Fälle stieg der Blutdruck während der Operation um mehr als 10 mm. In fast allen Fällen arbeitete man mit einer intravenös angewandten Scopolaminlösung und einer Zugabe von 0,0125 bis 0,02 Ephetonin. Der systolische Druck sank nur bei 4,7% der hohen Anästhesien unter 90 mm. In 4 Fällen (2%) trat ein Kollaps auf.

Franken³⁰⁾ verabreicht schon 15 Minuten vor der L.A. und nicht mehr anschließend daran Ephetonin; dies verhindert seiner Meinung nach das Absinken noch besser.

Rodriguez⁸⁰⁾ und Bermejo machten die Erfahrung, daß in 20% ihrer Fälle Hypotensionsstörungen auftreten, die aber im allgemeinen keinen ernsteren Charakter annehmen. R. und B. verwenden als Vorbeugungsmittel subkutan injiziertes Ephedrin in einer Dosis von 0,05 g. Dieses vermag allerdings das Auftreten der Hypotension nicht zu verhindern, aber der Arteriendruck ist doch nicht so niedrig, als wenn man das Ephedrin nicht anwendet. Wendet man die gleiche Dosis Ephetonin an, so erzielt man eine durchgreifende Wirkung auf den Arteriendruck. In vielen Fällen verhindert man sein Absinken ganz oder man erreicht zumindest eine nur sehr schwache Senkung.

Tovell⁷⁵⁾ hält das Benzedrin für die bequemste und sicherste Droge, ein normales Sinken des Blutdrucks während der L.A. aufzuhalten. Benzedrin ist von T. bei 31 Patienten angewandt worden, bei denen eine normale Reduktion des Blutdrucks während der L.A. beobachtet wurde. In 28 Fällen wurde dabei die Abnahme innerhalb von 3 bis 7 Minuten nach der Inhalation von Benzedrin aufgehalten. In 25 Fällen betrug die Abnahme des systolischen Drucks mehr als 5 mmHg, 21 mal mehr als 10 mmHg; 8 mal konnte der systolische Druck 100 mmHg nicht erreichen, bevor die Operation beendet war. Wie Ephedrin hat das Benzedrin eine ziemlich rasch einsetzende Anfangswirkung. In 3 Fällen mußte seine Wirkung durch subkutane Verabreichung von Epinephrin verstärkt werden, um das Ansteigen des Blutdrucks zu beschleunigen.

Benzedrin wird durch Inhalation verabreicht. Man bricht eine in Gaze eingehüllte Ampulle und läßt den Patienten 3 Minuten lang die Dämpfe tief einatmen.

Averett, Sußman und Zimring³⁾ verwenden Ephedrin eine halbe Stunde vor der Operation als gutes Prophylaktikum gegen eine zu starke Abnahme des Blutdrucks. In ihrer Erfahrung versagte das Epinephrin nicht als vasomotorisches Stimulans, mußte aber frühzeitig verabreicht werden, bevor der Blut-

druck zu tief gesunken war. In Fällen beunruhigender Blutdrucksenkung trotz vasomotorischer Stimulation wenden sie eine verstärkte Trendelenburg-Lage und eine Infusion physiologischer Kochsalzlösung an.

Kopfschmerzen.

Die unangenehmste Komplikation bei L.A. ist das Auftreten von Kopfschmerzen. Meistens stellen sie sich während der ersten 24 Stunden nach der Operation ein. Glücklicherweise lassen sich die Mehrzahl dieser Fälle erfolgreich behandeln mit Aspirin, Pyramidon usw. Die Stärke der Kopfschmerzen ist verschieden, zuweilen sind die Schmerzen so groß, daß die gewöhnlichen Medikamente keine Abhilfe schaffen.

In fast jedem Artikel der Literatur über L.A. begegnet man dieser Komplikation. Bier schrieb sie der toxischen Wirkung des Cocains zu. Man hat verschiedene Theorien vorgeschlagen zur Erklärung der Kopfschmerzen bei dieser Art von Anästhesie.

Höfemann³⁶⁾ machte einen Unterschied zwischen Patienten mit erhöhtem und vermindertem Liquordruck. Bei erhöhtem Druck üben meningeale Reizerscheinungen einen Einfluß aus. H. fand dann im Liquor Eiweiß- und Zellvermehrung. Für diese Art von Kopfschmerzen empfiehlt er Lumbalpunktion und Ablassen von Liquor. Der Liquordruck verminderte sich in 83% der Fälle.

Das Einsickern von Liquor durch die Punktionswunde in der Dura in die extraduralen weichen Gewebe ist weiter eine Ursache für das Auftreten von Kopfschmerzen. Castro Silva¹⁶⁾ führte 8 bis 14 Tage nach einer Lumbalpunktion Laminektomien aus und stellte fest, daß die Punktionsstrakte noch klafften und nur durch nicht adhärentes epidurales Fett geschlossen waren. Koster und Weintrob^{43c)} sind der Ansicht, daß infolge des beträchtlichen Durchsickerns von Liquor während der ersten paar Stunden nach der Operation eine Störung des intracranialen Druckes des Liquor eintrete. Es ist behauptet worden, daß der letztere Faktor, dadurch, daß er das „wäßrige Polster“ entfernt, ein Abrutschen und Anlehnen des Gehirns an das Knochengerüst des Schädels verursacht. Dieses wiederum reizt, wie man annimmt, die duralen

Fasern des Trigemini und die beiden Occipitalnerven. Druck auf den venösen Basilar-Plexus verringert den Ausfluß von venösem Blut aus der Cranialhöhle und führt eine erhöhte venöse Spannung herbei. Man glaubt, das Gehirn außer Berührung mit den genannten Nerven und dem venösen Plexus zu bringen und so die Kopfschmerzen zu mildern, wenn man den Kopf des Patienten tiefer legt. Erleichterung erhält man, wenn sich die Öffnung der Dura geschlossen, das Ausfließen von Flüssigkeit aufgehört hat und das normale „wässrige Polster“ des Gehirns wiederhergestellt ist.

Morrison ⁴⁰⁾ berichtete, daß der einzige wirkliche Nachteil der L.A. hartnäckige Kopfschmerzen seien. Nach seiner Erfahrung stellten sie sich hauptsächlich ein nach kleineren Operationen wie Haemorrhoiden und uteriner Curettage und waren im großen und ganzen der Tatsache zuzuschreiben, daß die Patienten im Bett aufsitzen. Burrus ¹²⁾ schreibt Kopfschmerzen dem Ausfließen von Liquor zu und gibt die Schuld den Nadeln großen Kalibers, da durch diese mehr Flüssigkeit durch die größere Öffnung entweichen kann und die Heilung entsprechend verzögert wird.

Aus der Kriego- und Nachkriegszeit liegt eine Reihe von Mitteilungen über Versagen und Nachwirkungen der L.A. vor. Kirschner ⁴¹⁾ berichtete von einer Häufung unangenehmer Zufälle wie vollkommenes Versagen, von Nebenerscheinungen wie Kollaps und heftigen Kopfschmerzen. Er schreibt dies Verunreinigungen der Präparate bei der industriellen Herstellung zu, vielleicht durch Mangel an geschulten Arbeitskräften zu erklären. Flörcken ²⁸⁾ fand feinste Metallteilchen, die von der Punktionsnadel oder Rekordspritze stammen; dieses, so meint er, sei die Ursache für die heftigen Kopfschmerzen.

Jaschke ^{39a)} machte die Erfahrung, daß in nur 9% von den 21,2% aller Fälle, in denen überhaupt Kopfschmerzen auftraten, diese wirklich als unangenehme Störung anzusehen waren. In den übrigen 12,2% ließen sie sich leicht durch Pyramidon u. ä. Mittel beseitigen. Nach Jaschkes Meinung ist zur Verhütung von Störungen vor allem eine glatte Technik nötig.

Folgende Verfahren werden empfohlen, spinale Kopfschmerzen zu vermeiden:

Sorgfalt in der Technik der L.A. wird Dural-Trauma und so das Ausfickern von Liquor verringern. Man verwende nur eine Nadel kleinen Kalibers. Während und nach der Operation darf der Kranke den Kopf nicht bewegen oder aufrichten. In einigen Krankenhäusern hält man den Patienten 12 Stunden nach der Operation in einer leichten Trendelenburg-Lage.

Martin und Arbuthnot⁴⁶⁾ empfehlen keine Beschränkung in der Verabreichung von Flüssigkeit vor der Operation. In der urologischen Abteilung des Angeles General Hospital bekommen die Patienten schwarzen Kaffee und jede Art von Wasser, die sie wollen, bevor sie in den Operationsaal gebracht werden. M. und A. vergleichen ihre Ergebnisse mit denen aus der allgemeinen chirurgischen Abteilung ihres Krankenhauses, wo die Kranken auf peroralem Wege am Morgen der Operation keine Flüssigkeit bekommen; und gerade bei diesen traten dumpfe frontale Kopfschmerzen auf.

Behandlung der Kopfschmerzen.

Zuerst sollte man das gewöhnliche Aspirin, Pyramidon, Coffein oder gar Codein verabreichen. Der Kranke muß in horizontaler oder leichter Trendelenburg-Lage verharren. Ein Eisbeutel kann auf den Kopf gelegt werden, da manche Patienten dies als lindernd empfinden. Man lasse während der ersten 24 Stunden keine Besucher zu, da dies zu Aufregung führt. Wenn die Kopfschmerzen durch erhöhten Liquordruck verursacht werden, ist es ratsam, Lumbalpunktionen anzuwenden, nachdem hypertonische physiologische Kochsalzlösung, Duretica usw. versucht worden sind. Koster und Weintrob zitieren Evans²⁰⁾, der eine intravenöse Infusion von 10%iger Glucose-Lösung in physiologischer Kochsalzlösung anwendet; hierdurch wird, wenn nichts anderes mehr hilft, bei dieser Art von Kopfschmerzen Erleichterung verschafft.

Im Brooklyn Womans Hospital, wo ich im Sommer 1925 famulierte, behandelte man gewöhnlich alle bei L.A. eintretenden hartnäckigen Kopfschmerzen mit einer 2 cc Einspritzung einer 20 oder 50%igen Magnesiumsulfatlösung. Ich entsinne mich eines Falles eines 24jährigen Mädchens, das wegen eines Myoms operiert

wurde. Wenige Stunden nach der Operation bekam es heftige Kopfschmerzen. Mit wenig Erfolg verabreichte man die üblichen Medikamente. So blieb es 4 Tage lang, bis man ihm 2 ccm einer 50%igen Magnesiumsulfatlösung gab. Die Wirkungen dieser Droge waren erstaunlich. Innerhalb von 10 Minuten begann das Mädchen sich besser zu fühlen und nach einer Stunde waren alle Zeichen von Schmerzen verschwunden.

In der Rostocker Klinik ³⁵⁾ fand man, daß die Nachwirkungen, besonders die Kopfschmerzen, auf eine durch die L.A. erzeugte Druckveränderung des Liquor zurückzuführen sind, und zwar am häufigsten auf eine Druckerniedrigung. Durch die Infusion von Kochsalzlösung sind diese Kopfschmerzen zu beseitigen.

Koster ⁴³⁾ verwendet intravenöse Magnesiumsulfatlösung mit einem innerhalb weniger Minuten eintretenden Erfolg. Er berichtet den Fall einer Krankenschwester, an der eine Cholecystectomy und Appendectomy ausgeführt worden war; die heftigen Kopfschmerzen, die sich einstellten, wurden selbst durch wiederholtes Abzapfen von Liquor nicht beseitigt. Auch eine Infusion von Magnesiumsulfatlösung brachte keine Abhilfe. Die Anwendung eines Hypophysen-Vorderlappen- und eines Schilddrüsenpräparats hingegen war von unmittelbarem Erfolg.

Rückenschmerzen und Nackensteifheit.

Neben den Kopfschmerzen werden von vielen Autoren Rückenschmerzen und Nackensteifheit beobachtet. Das Ganze bildet einen Symptomkomplex, den man unter dem Namen Meningismus zusammenfaßt und der als Folge einer durch die Injektion bedingten aseptischen Meningitis anzulehen ist. In der Sammelforschung von Hohmeier und König ³⁵⁾ ist zu lesen, daß Rückenschmerzen auch allein in Erscheinung traten. Diese dürften wohl von dem Einstich herrühren, vielleicht auch von der Bildung eines intramuskulären Häatoms eher als von der Reizung der Meningen. Die Rückenschmerzen treten in etwa 25% aller Fälle auf. Manchmal wird das ungewollte Einführen von Fremdkörpern als Ursache berichtet. So von Flörcken ²⁸⁾. In jedem Fall sind die Rückenschmerzen nur von kurzer Dauer. Zuweilen kommen sie

daher, daß der Patient sich nicht in geeigneter Lage auf dem Operationstisch befindet.

Pfychische Behandlung.

Es ist von großem Vorteil für den Patienten wie für den Chirurgen, wenn der Kranke während der Operation von einer in dem Verfahren geschulten Person beobachtet wird. Eine solche Hilfskraft, sie kann entweder eine Krankenschwester oder einer der jüngeren Assistenten sein, kann zum Patienten sprechen und seine Furcht vertreiben. Gewöhnlich genügen ein paar beruhigende Worte, um den Durchschnittspatienten zu befänftigen. Oft schläft der Patient während der Operation ein. Natürlich bekommt er, ehe er in den Operationsaal gebracht wird, Morphium und Atropin. Auch Kinder können auf diese Weise behandelt werden.

In den Fällen, wo die Patienten aufgereggt und hysterisch sind und nicht mitarbeiten, müssen andere Maßnahmen getroffen werden.

In der Kirschner'schen Klinik ⁵⁴⁾ gibt man zur Dämpfung der Psyche des Patienten eine „schwache“ Lösung von Scopolamin, Eukodal und Ephetonin. Diese enthält in 1 ccm Flüssigkeit 0,0005 Scopolamin. Die intravenöse Injektion geht langsam vor sich, etwa $\frac{1}{2}$ ccm in 1 Minute. Sowie der Kranke etwas müde wird, bricht man die Injektion ab. Bei kräftigen Leuten brauchte man etwa 5 bis 8 Teilstriche der 1 ccm Ampulle, nur selten mußte man diesen den ganzen Inhalt geben. Durch die Injektion von Scopolamin dämpft man sehr wirkungsvoll die Psyche des Patienten; er wird ruhig und empfindet unangenehme feelische und körperliche Einwirkungen nicht mehr. Der Kranke ist bei vollem Bewußtsein, aber etwas schläfrig.

In der Klinik von Koster ^{43b)} verwendet man Natriumamytal als Zugabe bei L.A. Die Lösung wird in der Spritze vorbereitet. Man sagt dem Patienten, daß ein Tropfen Blut zur Untersuchung gebraucht wird. Das Natriumamytal wird dann langsam in die Vene injiziert. Der Patient schläft ein und wird in den Operationsaal überführt. Es stellt sich keine Übelkeit oder Aufregung und

kein Erbrechen ein, bevor der Kranke einschläft. Der Schlaf dauert an zwischen 4 und 16 Stunden.

Wenn man jedoch die Anwendung solcher Drogen vermeiden möchte, kann man sich auf Morphin-Atropin verlassen, das durch 2 cc einer 50%igen Magnesiumsulfatlösung ergänzt ist, wie man es in Amerika in der Geburtshilfe zur Dämpfung der Psyche der Kranken verwendet. Ich weiß nicht, ob man es je außerhalb der Geburtshilfe bei L.A. erfolgreich gebraucht hat. Ich möchte es bei dieser Gelegenheit vorschlagen.

Lungenkomplikationen.

In den meisten Artikeln erscheint die Frage der postoperativen pulmonalen Komplikation. Campbell¹³⁾ behauptet, daß solche Umstände erheblich häufiger sind bei Inhalationsnarkose als bei L. A. Foß und Schwalm²⁹⁾ machten die Erfahrung, daß bei beiden Formen der Anästhesie diese Komplikation in gleichem Maße auftritt. Von 137 Todesfällen bei Äthernarkose traten 11 ein infolge von Pneumonie, von 140 bei L.A. waren 13 auf Pneumonie zurückzuführen. Koster und Weintrob^{43e)} behaupten, daß bei L.A. Pulmonalkomplikationen weniger häufig sind als bei Inhalationsnarkose. Unter 1000 Fällen bekamen 3 nach der Operation Pneumonie, 11 Bronchitis, 4 trockene Pleuritis und 1 Lungenkollaps. Keiner hatte tödlichen Ausgang. Diese Fälle wurden während des Sommers und des Winters operiert. Vergleicht man diesen Bericht mit dem von Cutler und Hunt²⁰⁾, in dem 55 Pulmonalkomplikationen mit 11 tödlichen Ausgängen bei 1562 Operationen unter Inhalationsnarkose vorkommen, so kommt man zu dem Schluß, daß L.A. zu bevorzugen ist.

Warnecke⁷⁸⁾ hat in 1800 Fällen unter L.A. nie ernste Schädigungen beobachtet, wie sie in Form von Reizpneumonie, Chloroform-Herz-Tod usw. bei Äther- und Chloroformnarkose auftreten.

Man nimmt an, daß die Reizwirkung der Inhalationsnarkose auf die Tracheobronchialschleimhaut disponiert für Pulmonalinfektionen. Ohne Zweifel verringert L.A. die Gefahr der Lungenkomplikation.

Ich glaube, daß die Gefahr der Pneumonie bei L.A. weiter reduziert werden kann, wenn der Patient nicht nur nach der Injektion, sondern auch, während er sie bekommt, warm gehalten wird. Ich habe beobachtet, daß in verschiedenen Krankenhäusern, die ich besuchte oder wo ich arbeitete, dieser Punkt vernachlässigt wurde.

Als Prophylaxe gegen Pulmonalkomplikationen schlugen A v e r e t, S u ß m a n und Z i m r i n g ³⁾ die Inhalation von Sauerstoff und Kohlendioxyd während der Operation als wertvoll vor. Wenn Sauerstoff und Kohlendioxyd nicht angewandt wurden, traten in 5 % ihrer Fälle Pulmonalkomplikationen auf; bei Anwendung von $O_2 + CO_2$ hingegen nur 1 %.

Neurologische Komplikationen.

Nervenverletzungen als Folge der L.A. sind gewöhnlich vorübergehender Natur. Glücklicherweise ereignen sie sich nicht oft. Es werden aber auch Fälle berichtet, bei denen sich neurologische Symptome noch monatelang nach der Operation zeigten. In den Anfängen der L.A. ereigneten sich viele solche Fälle, die möglicherweise mangelhafter Technik zuzuschreiben sind. Verletzungen des Rückenmarks oder seiner Wurzeln können zu Anästhesie, Parästhesie, trophoneurotischen Veränderungen und in deren Gefolge zu Atrophie der Muskeln, Decubitus und heftigen Nervenschmerzen führen. In sehr seltenen Formen, wenn ernste Verletzungen stattgefunden haben, kann dauernde Lähmung einsetzen. Fälle von vorübergehender Anal- oder Vesikalinkontinenz sind berichtet worden.

In der Sammelforschung von H o h m e i e r und K ö n i g ³⁵⁾ kommen 5 Fälle von Abducenslähmung vor, darunter 3 bleibende. In 1 weiteren Fall trat Ptosis des rechten oberen Augenlids auf, bei 2 anderen Patienten beobachtete man vorübergehende Krämpfe epileptischer Art. Ferner: Parästhesien in der Operationswunde und den unteren Extremitäten, Ischias-ähnliche Schmerzen, starken, lang anhaltenden Tremor der Hände. Mit Ausnahme der Abducenslähmung verschwanden aber nach einiger Zeit alle diese neurologischen Erscheinungen und ein Teil der Patienten, die zur Nachuntersuchung kamen, hatten keinerlei Klagen mehr.

A d a m ⁴¹⁾ berichtet einen Fall linksseitiger Abducenslähmung nach L.A. Wie dieser Fall sich entwickelt hat, ist nicht festzustellen, da keine weiteren Berichte darüber erschienen.

K i r s c h n e r ⁴¹⁾ sieht die Ursache für einen von ihm beobachteten Fall von Abducenslähmung in unzureichendem Material aus der Kriegszeit.

W o l f ⁸⁰⁾ schreibt über einen Fall von Abducenslähmung nach einfacher Lumbalpunktion ohne Anwendung einer toxischen Substanz. Eine erhebliche, offenbar aus einem verletzten intraduralen Gefäß stammende Blutung erschwerte dabei die Punktion. Die Lähmung trat einige Tage nach der Punktion auf, verschwand aber bald wieder. Wolf glaubte, daß ein intradurales Hämatom in irgendeiner Weise die Quelle für eine toxische Wirkung auf den Abducenskern gewesen sei und so zur Lähmung geführt habe.

R e b e r ⁵⁹⁾ beobachtet 5mal Augenmuskellähmungen. Die Lähmung trat 2mal 7 Wochen, 1mal 10, 1mal 12 und 1mal 8 Wochen nach der Operation auf und dauerte 1mal 14 Tage und 1mal 6 Monate. In den anderen Fällen war die Dauer nicht festzustellen. E w a l d ²⁷⁾ berichtet einen Fall von L.A., der in 17 Tagen behoben war.

S c h m i d t ^{64a)} hat zusammen mit den Neurologen Patienten, die unter L.A. operiert worden waren, bis zu einem Jahr lang regelmäßig untersucht, ohne daß ernsthafte Störungen festgestellt werden konnten. In einem Fall blieben die Achillessehnenreflexe aus, und hyperästhetische Zonen an den Beinen wurden festgestellt; doch hatten diese Patienten keinerlei Schmerzen empfunden.

C a s e ¹⁵⁾ beschreibt einen Fall von Nervenkomplikation nach einer Perinealplastik unter L.A. Als die Anästhesie abzuklingen begann, klagte der Patient über Schmerzen in der Gegend des Steißendes. Zusammen mit den Schmerzen stellte sich ein sattelförmiger Bereich von totaler Anästhesie in der Dammgegend und im Gefäß ein, sowie rectale und vesicale Inkontinenz. Die Heilung des Falles war eine vollkommene.

K o s t e r und W e i n t r o b ^{34e)} hatten den Fall eines 26jährigen Mädchens mit neurologischer Komplikation. Acht Tage nach der Operation wegen Suspension des Uterus und Appendektomie

bekam es eine Schwäche der linken quadriceps Femoris-Muskelgruppe, welche immer schlimmer wurde, so daß es zwei Wochen nach der Operation ihr Bein nicht vom Bett heben konnte. Drei Monate lang konnte es nicht gehen. Allmählich wurde die Muskelkraft wiederhergestellt und am Ende eines Jahres war der Oberschenkel wieder in normaler Verfassung. K. und W. erlebten zwei weitere Fälle von Schwächung der quadriceps-Muskelgruppe, die 4 bis 5 Tage dauerte.

Viele Autoren betrachten anale und vesikale Inkontinenz als eine bei L.A. eintretende Komplikation. Vielen wiederum ist diese nicht begegnet, oder, wenn sie eintrat, war sie nur von kurzer Dauer. O r t h ⁵³⁾ beobachtete einen Fall von Fäkalinkontinenz der spontan nach fünf Tagen wieder verschwand. In einem Fall von S o u r a s k y ⁷⁰⁾, der durch eine Überdosierung von Stovain hervorgerufen wurde, bekam der Patient vesikale Inkontinenz. Dieser folgte alsbald eine gelegentliche Fäkalinkontinenz. Ein ganzes Jahr verging, bis die Funktionen wieder völlig hergestellt waren.

Meningitis.

Das Auftreten einer echten purulenten Meningitis als Komplikation bei L.A. ist sehr selten, aber sie kommt tatsächlich vor. Ich habe in der Literatur nur wenige Fälle finden können. Von diesen hatten zwei tödlichen Ausgang. Meningitis lediglich als Folge einer diagnostischen Spinalpunktion, ist auch aufgetreten.

Die ersten Symptome der Meningitis stellen sich in den ersten 48 Stunden nach der Operation ein. Und zwar sind dies Kopfschmerzen, Nackensteifheit, Ruhelosigkeit und Augenstörungen. Bald darauf treten die echten Anzeichen einer purulenten Meningitis zutage. Der Liquor ist trübe, das Globulin und die Zellen sind vermehrt, der Erreger ist feststellbar und der Liquordruck ist erhöht.

Fälle echter purulenter Meningitis sind berichtet worden von Wertheimer ⁷⁹⁾, Senge ⁶⁸⁾ und Sanchis Banus ⁶³⁾. K o s t e r ^{43c)} hatte einen Fall eines 16jährigen Mädchens, bei dem sich die klassischen Symptome von Meningitis einstellten und das nach drei Wochen starb. Er bringt auch einen unveröffentlichten Bericht über einen Fall von Meningitis mit tödlichem Ausgang als Folge von L.A., der sich in einem Brooklyn Krankenhaus ereignete.

Symonds⁷⁴⁾ berichtet über einen Fall von Meningitis als Folge bloßer diagnostischer Lumbalpunktion. Der Patient wurde wieder gesund. Auch Sonnenfchein⁶⁹⁾ berichtet über einen solchen Fall, nur mit tödlichem Ausgang.

Van Lier⁷⁷⁾ beschreibt eine Staphylococcen-Meningitis. Diese entstand dadurch, daß eine Nadel, die durch einen unerwarteten Abzeß im Sacrospinalmuskel gegangen war, in den Arachnoidealraum eingeführt wurde. Der Patient wurde wieder gesund.

Um das Auftreten von Meningitis nach L.A. zu verhindern, muß darauf geachtet werden, daß sich in der Gegend der Punktion keinerlei Infektion befindet. Außerdem muß der Rücken des Patienten gut desinfiziert werden, damit keine Keime in den Subarachnoidealraum eindringen können.

Indikationen für L.A.

Die Indikationen und Kontraindikationen, die die frühen Autoren für L.A. angeben, unterscheiden sich in erstaunlichem Maße von denen, die in der jüngsten Literatur zu finden sind. Früher wandte man L.A. nur dann an, wenn der Patient zu krank war, um eine Inhalationsnarkose zu ertragen. In der frühen Literatur findet man fast nur Kontraindikationen für L.A. Diese Kontraindikationen werden heute fast alle als Indikationen aufgeführt.

Preisseccker⁵⁷⁾ vergleicht in seinem Buch die Standpunkte von damals und heute, indem er Stolz⁷²⁾ — 1904 — und Evans²⁸⁾ — 1929 — zitiert. Stolz schrieb:

„Mit Rücksicht auf den Allgemeinzustand würde die Lumbalanalgesie dann empfohlen, wenn die Operation eine Lebensbedingung darstellte, die allgemeine Narkose aber aus irgendwelchen Gründen — z. B. Schwäche des Herzens, Erkrankungen der Lungen und Nieren, Ernährungsstörungen, hohes Alter — usw. — nicht ratsam erschien. Über die Zweckmäßigkeit dieser Indikationsstellung kann erst entschieden werden, wenn sich die Lumbalanalgesie als vollständig ungefährlich erwiesen hat.“

Es folgt hier eine Zusammenstellung der Gegenanzeigen von 1904:

- „1. Läsionen des Herzens und der großen Gefäße, insbesondere Arteriosklerose.
2. Chronische Erkrankungen der Respirationsorgane.
3. Nervosität, Krankheiten des Nervensystems und Hysterie, weil der nervöse Schock zu übeln Nachwirkungen führen könnte.
4. Ein Alter unter 10 und über 50 Jahren.
5. Die Unmöglichkeit der aseptischen Ausführung der Injektion, z. B. bei septischen Kranken.“

Alle früheren Chirurgen waren derselben Ansicht, mit Ausnahme einiger Franzosen unter der Führung von Tuffier. Diese sahen eine Kontraindikation lediglich in einem Alter unter zehn Jahren. Gray³²⁾ wiederum hält die L.A. für ganz besonders geeignet bei ganz jungen Kindern, sogar bei Neugeborenen.

Evans stellt 1929 positive Indikationen auf. Allerdings schränkt er diese wiederum durch eine Reihe von Kontraindikationen ein.

Seine Indikationen lauten:

- „1. Fälle, in denen eine Totalnarkose durch Alter, Schwäche, Herz-, Nieren-, Leber-, Lungen- und endokrine Krankheiten gefährlich ist.
2. Fälle mit hohem Blutdruck, wenn noch nicht deutliche Zeichen von Herzschwäche vorhanden sind. Ein geringer systolischer Blutdruck wird allgemein als strenge Kontraindikation angenommen.
3. Fälle mit Zeichen von Nierenschädigung.
4. Schwere Darmerkrankungen (Intestinal obstruction of all types).
5. Fälle mit akuter Entzündung der oberen Respirationswege.
6. Dringlichste Operationsfälle, wenn die Zeit zur gründlichen Vorbereitung fehlt.“

Preissecker betont, daß Evans an die Spitze seiner Aufstellung folgenden Satz stellt: „Wenn eine Operation unterhalb des Zwerchfells notwendig ist und eine Allgemeinnarkose nicht gegeben werden kann, so besteht keine Kontraindikation für L. A.“ (S. 16 der Originalarbeit).

Die Kontraindikationen von Evans lauten:

- „1. Eine festgestellte schwere Veränderung des Zerebrospinalsystems, wie Tumoren und Hämorrhagien in diesem; Lues, Meningitis; jede abnormale Veränderung des Liquors.
2. Jede schwere Beeinträchtigung des Respirationstraktes, pleurale Ergüsse usw. — Hingegen Lungentuberkulose, ausgenommen die schwereren beiderseitigen Fälle, stellt keine Kontraindikation dar.
3. Fälle mit Unterdruck sind riskant, besonders wenn Neigung zu Zyanose, Dekompensation und dergl. besteht. Bei einem systolischen Druck von 100 liegt die untere Grenze, ausgenommen die Möglichkeit, daß man durch Stimulantien während der Operation den Druck höher halten kann.
4. Schwere ikterische Personen mit Gallensteinen oder Pankreaskarzinom sind bei jeder Narkoseart schockgefährdet.
5. Schwer mitgenommene (extremely depressed) oder traumatisch schockierte Personen vertragen keine plötzliche Änderung des Gefäßtonus. Wenn aber der Schock nicht hämorrhagischen Ursprungs ist, dann darf die L.A. gemacht werden.
6. Septikämische Fälle mit positiven Blutkulturen, weil die Schutzbarriere zwischen dem infizierten Blut und den Nervenzentren aufgehoben würde; aus dem gleichen Grunde Tuberkulose und syphilitische Fälle.
7. Patienten mit schwerer Herzmuskelentartung und labilem Gefäßsystem, Neigung zur passiven Hyperämie, vertragen ebenfalls sehr schlecht einen plötzlichen Wechsel des Gefäßtonus.
8. Eiterung in der Nähe der Punktionsstelle.“

Arnold²⁾ ist der Ansicht, daß L.A. besonders indiziert ist bei Patienten mit respiratorischen Erkrankungen und fand, daß Hypotension nicht mehr als Kontraindikation anzusehen sei. Er machte auch gute Erfahrungen bei organischen Erkrankungen der Leber, der Nieren, sowie bei Stoffwechselkrankheiten. Hampton³⁾ glaubt, daß man die L.A. anwenden müsse in Fällen mit schlechter Prognose bei Operationen am unteren Abdomen und an den unteren Extremitäten. So operierte er Patienten mit akuten

oder chronischen Pulmonal-, Leber- oder Nierenkrankheiten wie Tuberkulose, Bronchiektasie, Pneumonie, Bronchitis, Cirrhose, biliare Karzinome, Nephritis, Nephrose, Renaltumor usw. Ferner operierte er Patienten mit chronischen Herzklappenkrankheiten, Diabetes und schweren Anämien. Koster vertritt die Ansicht, daß keine Kontraindikationen für die Anwendung der L.A. bestehen außer lokale Infektionen in der Gegend der Punktion und Cerebralneoplasmen. F r i e b e r g ⁷¹⁾ schreibt, daß er keinerlei Kontraindikationen der L.A. kennt. Auch mit ihrer Anwendung bei Graviden, die von einigen Gynäkologen abgelehnt wird, hat er gute Erfahrungen gemacht.

Sind die Operationsarten, die unter L.A. ausgeführt werden können, begrenzt?

Die früheren Autoren und auch einige der neueren vertreten die Auffassung, daß Operationen unter L.A. auf die unteren Extremitäten beschränkt werden müssen.

Die experimentellen und klinischen Forschungen in den früheren Stadien der Entwicklung der L.A. waren darauf bedacht, die Analgesie auf die Gegend unterhalb des Zwerchfells — hauptsächlich auf die Leistenbeugen, das Becken, die Analgegend und die unteren Extremitäten — zu beschränken. Diesen konservativen Standpunkt vertraten Bier, Schwarz, Preindlsberger u. a. Einige der Chirurgen, die als erste die L.A. anwandten, stellten sich damit nicht zufrieden und waren bestrebt, die Anästhesie auf höhere Körperregionen auszudehnen. Schon 1900 berichtete Tuffier in der französischen Medizinischen Akademie über eine Serie von mehr als 80 Fällen, in denen er eine Anästhesie bis zum Umbilicus herstellte. Er war so zufrieden mit seinen Ergebnissen, daß er die Absicht kundtat, seine Aufmerksamkeit auf eine Ausdehnung der Anästhesie nach oben zu richten im Hinblick auf Operationen an der Leber, am Magen und am Thorax. Bis 1901 hatte er schon eine große Anzahl von Fällen in der Bauchhöhle operiert, worunter solche am Magen, am Darm, an den Nieren usw. Schon 1900 hatten in Amerika Tait, Caglieri, Morton und andere Operationen unter L.A. an verschiedenen Teilen des Körpers oberhalb des Zwerchfells ausgeführt. Sie erreich-

ten die Anästhesie durch Injektion in jeder beliebigen Höhe der Wirbelsäule, je nachdem wie die beabsichtigte Operation es erforderte. Die Arbeit dieser Chirurgen geht der von J o n n e s c o (Rivista de Chir.) 1909) um mindestens sieben Jahre voraus. Um eine höher hinaufreichende Anästhesie zu erzielen, injizierte. J. in jeder Höhe der Wirbelsäule Stovain, Novocain oder Tropococain mit einem Zusatz von Strychnin in den Subarachnoidealraum.

Man fand bald, daß durch die Lösung des Anästhetikums in Liquor und durch die Anwendung der Trendelenburg-Lage mit Leichtigkeit die Anästhesie höher hinaufgetrieben werden konnte. K a d e r führte sogar Kopfoperationen unter L.A. aus.

Vielleicht hat man in Amerika deshalb schon so früh so gute Ergebnisse erzielt, weil man dort schon 1902 das Anästhetikum in Liquor löste und daher nicht so viele und so heftige Nebenwirkungen eintraten wie bei den Operationen, die unter L.A. in anderen Ländern durchgeführt wurden.

Heute wird die L.A. bei Operationen an allen Teilen des Körpers angewandt; die Literatur weist sogar Fälle auf, wo unter L.A. Mastoideus-Operationen ausgeführt wurden.

Nach Durchsicht der Literatur, in welcher die verschiedensten Operationsarten unter L.A. vorkommen, muß man einen ganz anderen Standpunkt einnehmen. Wir zitieren hier einige Autoren:

M ü l l e d e r ⁵¹⁾ operierte unter L.A. alle perforierten Ulcera, Ileus, verschleppte Appendicitis, Ileocökalumoren, mesenteriale Thrombose, Hernia umbilicalis und inguinalis, besonders bei älteren Leuten. Ferner operierte er Gangraena senilis et diabetica und Osteomyelitis femoris. Bei gynäkologischen Operationen ist für M. die L.A. die Methode der Wahl.

F o s s und S c h w a l m ²⁹⁾ haben in ihrer Serie von 2000 Fällen unter L.A. operiert: Amputationen aller Art, Appendektomien, Laparotomien (hauptsächlich wegen Karzinomen), Hernien, Operationen an Knochen und Gelenken, an Gallenblase und ihren Ausführungsgängen, an Niere, Blase und Prostata, Becken, Magen und Darm, Splenektomien usw. In der Jackson-Klinik ³⁸⁾ sind 80% aller größeren Operationen unter L.A. ausgeführt worden. L a b a t ⁴⁴⁾ empfiehlt die L.A. nicht für Operationen an Kopf, Hals und Tho-

rax, hält sie aber für vollkommen sicher bei Operationen unterhalb des Zwerchfells, wenn alle Einzelheiten der Technik beobachtet werden.

K o f f e r ⁴³⁾ hat unter L.A. die üblichen Abdominaloperationen ausgeführt; außerdem operierte er wegen Osteomyelitis an unteren und oberen Extremitäten, Tracheoplastik, Costalektomie und Thoraktomie, Thyreoidektomie. Resektion der Cervikaldrüsen, Excision von Tumoren an der Zunge, am Gesicht und an der Kopfhaut, Nasenplastik. Mit seinem Mitarbeiter W o l f ⁸⁰⁾ operierte er 27 Fälle akuter Mastoiditis unter L.A. In dieser Serie von 27 Fällen lag das Alter der Patienten zwischen 6 Monaten und 68 Jahren. In vier Fällen wurde bilaterale Mastoidotomie ausgeführt, in einem weiteren eine Sinus-Operation mit Abbinden der vena jugularis. In jedem Fall war die Anästhesie zufriedenstellend. Dabei war die Abnahme von Blutungen nicht nur in den weichen Geweben über den Knochen, sondern auch im Knochen selbst als auffallend zu beobachten.

M o r r i s o n ^{49a)} wendet L.A. für alle abdominalen Operationen an, wie Hysterektomie, Ovariectomie, Appendektomie, Nephrektomie, Splenektomie, Leberabszeß, für Thoraxoperationen wie Empym, Thoracostomie, Rippen- und Clavikularnekrosen. Er nimmt Kopf- und Halsoperationen aus, weil er für diese die L.A. weder leicht ausführbar noch angebracht hält.

D i P a c e ²³⁾ hat L.A. bei Operationen oberhalb des Nabels — an Thorax, Brust, Rücken, oberen Extremitäten, ferner bei Armamputationen und Entfernung von tuberkulösen Halsdrüsen angewandt.

R o l a n d o ⁶¹⁾ und seine Kollegen haben einige Tausende von Operationen unter L.A. in der Gegend unterhalb des Nabels ausgeführt: untere Gliedmaßen, Urogenitalapparat, Rectum, Uterus und Adnexe, Appendix und Prostata.

L.A. ist erfolgreich in der Gynäkologie und in der operativen Geburtshilfe angewandt worden. Bei normalen Geburten bringt sie keine besonderen Vorteile, ja eher Nachteile mit sich. J a f c h k e ^{38b)} hält nach einer Erfahrung von 5846 Fällen die L.A. für das beste Anästhesieverfahren in der Gynäkologie.

In der Wiener Univ. Frauenklinik ⁵⁷⁾ wurden in einem Zeitraum von 26 Monaten 1200 Operationen unter L.A. ausgeführt. Etwa zwei Drittel der Fälle waren Laparotomien, ein Drittel vaginale Operationen. In 1018 Fällen wird die L.A. als ideal, in 39 als gut, und in 45 als nicht ausreichend bezeichnet. Von den Laparotomien waren 126 leichter, 454 schwerer Art und 184 Karzinomoperationen. Von den vaginalen Operationen waren 190 leichte, 204 schwere und 39 Karzinomfälle. Cosgrove ¹⁸⁾ hat viele Tausende normale und operative Entbindungen unter Anwendung von L.A. ausgeführt.

In einem Vergleich der Anwendung der L.A. bei gynäkologisch kranken und bei graviden Frauen äußert sich Preissecker folgendermaßen (S. 48): „Es läßt sich allerdings nicht leugnen, daß in der Literatur prozentual mehr Todesfälle bei graviden Frauen niedergelegt sind als bei nicht graviden — ja, an manchen Stellen hat man wegen gehäufter schlechter Erfahrung die Spinalanästhesie in der Geburtshilfe aufgegeben!“

Pr. rät zu ganz besonderer Vorsicht bei der L.A. in der Schwangerschaft. In der II. Universitäts-Frauenklinik Wien wird bei geburtshilflichen Operationen L.A. hauptsächlich beim Kaiserschnitt angewandt. Immer wieder wird die geringe Blutung und gute Uteruskontraktion bei Anwendung von L.A. hervorgehoben. Pr. schreibt (S. 51): „Wann bevorzugen wir die L.A. in der Geburtshilfe also? Als Ersatz eines Dämmer schlafs müssen wir sie von vornherein ablehnen, weil das Risiko bei der L.A. immerhin zu groß ist, und sie daher im Vergleich zu dem schmerzlosen Ablauf einer Spontangeburt einen zu großen Einsatz darstellt; ganz abgesehen davon, daß bei Spontangeburt die Ausschaltung der Bauchpresse durch die L.A. die Austreibungsperiode sehr verzögert, und deshalb mehr operative Beendigungen der Geburt nötig werden.“

Im Brooklyn Womans Hospital wird L.A. bei den operativen geburtshilflichen Eingriffen nur bei Kaiserschnitt, niemals bei normalen Geburten angewandt.

Vorteile der L.A.

Ich habe in dieser Arbeit absichtlich die Schattenseiten der L.A. hervorgehoben. Die Vorteile sind sehr zahlreich und übertreffen die Nachteile, denen wir begegneten. Diese Art der Anästhesie kann unter den besten wie den schlechtesten Umständen angewandt werden. Sei es in einer gut ausgestatteten Klinik oder in einem kleinen Landkrankenhaus oder in einer Tropenstation. Nach der Erfahrung von Houghton³⁷⁾ eignet sich die L.A. besonders für Kolonien, v. a. in tropischen Gegenden, wo ein Mangel an Ärzten, sonstigen Hilfskräften und Instrumenten besteht. Harrison³⁸⁾, der in Arabien tätig war, schreibt, daß für den Chirurgen, der mit einfacher Ausrüstung und wenig Assistenten arbeitet, die Anästhesie das größte technische Problem darstellt. Nach seiner Erfahrung trägt die Anwendung der L.A., die vom Chirurgen selbst verabreicht werden kann, viel zur Lösung dieses Problems bei.

Bei Äther- und sonstigen Inhalationsnarkosen hängt der Erfolg der Anästhesie zum großen Teil von dem Geschick des Narkotiseurs ab. Bei der L.A. braucht man keinen geschulten Narkotiseur. Dies ist wichtig in kleineren Krankenhäusern, wo die Inhalationsmethode angewandt wird und die Narkose von einer Krankenschwester oder einem unerfahrenen Praktikanten gegeben wird. Bei L.A. kann der Chirurg sein eigener Narkotiseur sein. Zur Beobachtung des Blutdrucks kann eine Krankenschwester oder ein Praktikant Hilfe leisten. Wer eine einfache Lumbalpunktion ausführen kann, kann auch eine L.A. ausführen. Morrison^{39a)} narkotisierte in 11000 Operationen selbst und meint, daß ein besonderer Narkotiseur nicht nötig sei. Da alle Krankenhäuser darüber klagen, daß ihre Mittel beschränkt seien, ist die L.A., verglichen mit Äther- und anderen Inhalationsmethoden ein billiges Verfahren.

Wo Zeit eine Rolle spielt, besonders in großen Kliniken, wo an einem Morgen 10 bis 12 Fälle operiert werden müssen, ergeben sich neue Vorteile der L.A. Allgemeine Narkose erfordert 10 oder mehr Minuten, bis der Patient für die Operation bereit ist. Bei der L.A. kann man dies in wenigen Minuten erreichen. Sowie der Chirurg damit fertig ist, sich zu waschen, kann er mit der Operation beginnen. Man verliert keine Zeit durch das Festbinden des Patien-

ten am Tisch. Es gibt keinen Kampf mit dem Patienten wie während des Excitationsstadiums bei der Inhalationsnarkose. Ich habe viele Fälle gesehen, wo das Operationsfeld verunreinigt wurde, dadurch daß der Patient sich herumwarf. Viel Zeit ging verloren, da das Operationsfeld aufs neue desinfiziert werden mußte. Bei eiligen Fällen, wo keine Zeit ist, den Patienten richtig für die Operation vorzubereiten, hat die L.A. ihre Vorteile. Ein Patient kann von der Straße hereingebracht werden und innerhalb von zehn Minuten für die Operation bereit sein. Bei L.A. ist vorherige Magenaushebung wie bei allgemeiner Narkose nicht nötig.

Es ist eine bekannte Tatsache, daß Lumbalanästhesie operativen Schock verhindert. Das Aufhalten der Schockreize, die vom Operationsfeld kommen, hat einen sehr günstigen Einfluß auf das Zentralnervensystem. Wright⁸¹⁾ nennt L.A. einen wahren „Lebensretter“ unter gewissen Umständen, wie Operationen, die leicht Schockwirkungen mit sich bringen.

G. W. Crile¹⁹⁾ berichtet, daß sie während des Krieges in einem Frontlazarett unter Äther-, Nitrooxydgas- und Lumbalanästhesie operiert hätten. Die Unterschiede in der Mortalitätsziffer bei Amputationen des Oberschenkels, die mit den verschiedenen Narkosearten ausgeführt wurden, waren deutlich und überraschend. Von 100 Soldaten, deren Oberschenkel unter Äthernarkose amputiert wurde, starben 63, unter L.A. nur 20. Bei Nitrooxydgasnarkose ergaben sich etwa die gleichen Zahlen wie bei L.A. Diese günstigen Ergebnisse glaubte Crile der schockverhindernden Wirkung der L.A. zuschreiben zu müssen.

Arnold²⁾ vertritt die Ansicht, daß L.A., wenn sie nicht besonders kontraindiziert ist, die beste Narkose für Abdominaloperationen darstellt. Man erreicht durch die L.A. vollständigere und zuverlässigere Anästhesie als durch irgendeine andere Methode. Die Peristaltik ist gut im Gang, die Sphinktern sind entspannt, die Entspannung der Bauchmuskulatur ist eine vollständige, der Darm tritt nicht heraus, die Atmung ist ruhig, und der Chirurg kann rasch und ohne Trauma zu verursachen, beste Arbeit leisten. Bei Darmobstruktionen ist es vorteilhaft, L.A. anzuwenden; wenn nl. diese Obstruktion durch Ileus hervorgerufen wird, tritt innerhalb

von 20 Minuten eine Darmgasentleerung ein. Bei Peritonitis sollte die L.A. angewandt werden, weil diese ein Minimum von Trauma bedingt; selbst dann, wenn man die bei Peritonitis günstige Beckentieflage zugunsten der Trendelenburg-Lage aufgeben muß. — K o f f e r und M a k a i ^{43c}) beschreiben die Vorteile folgendermaßen: „Die hochgradige Erschlaffung der Bauchhöhlenmuskulatur, das Zurücksinken der Darmschlingen auf die hintere Bauchwandung, ergeben ein eigenartiges Bild für den, der gewöhnt ist, an narkotisierten Kranken mit geblähten, aus der Bauchwunde hervorfällenden Därmen feine Bauchbefunde zu erheben. Die eigentliche Laparotomie, die Eröffnung des Peritoneums, wird leicht, gefahrlos, schnell, ohne ängstliche Hervorhebung mit Haken, Pinzetten, fast wie an der Leiche ausgeführt. Bei der L.A. wird man nicht durch einen unruhigen, oberflächlichen, durch Reflexe gestörten Schlaf im zilsicheren Weiterarbeiten gehemmt. Die Därme sind nicht gebläht, ihre Wandung nicht papierdünn und leichtverletzlich, sondern kontrahiert. Außerordentlich oft erfolgt nach der Spinalanästhesie eine Darmentleerung schon am Operationstisch, welche natürlich nicht nur die Arbeit des Chirurgen wesentlich erleichtert, sondern auch für den weiteren Verlauf von günstiger Bedeutung ist. Die Lage der Darmschlingen, ihre kontrahierte Wandung bilden die günstigste Konstellation für Hantieren, Entleerung, Nähte usw. Besonders erwähnenswert ist die leichte Beweglichkeit sämtlicher Bauchorgane, was namentlich beim Freilegen der Gallenwege eindrucksvoll ist.“

M o r r i s o n ^{49a}) bedauert es, daß ein Chirurg, der nur Allgemeinnarkose anwendet, nichts wisse von der Leichtigkeit und Einfachheit, mit welcher unter L.A. eine Splenektomie, eine Nephrektomie, Hernia, ja sogar Haemorrhoiden operiert werden können.

Chronischen Alkoholikern, Opium- und Morphinumfüchtigen eine Äthernarkose zu geben, ist höchst unangenehm, da auf solche Patienten Äther eine der Betäubung entgegengesetzte Wirkung hat. Wer einmal in solchen Fällen eine Äthernarkose gegeben hat, wird die unangenehmen Wirkungen nicht so leicht vergessen. Bei L.A. hingegen begegnet man diesen Unannehmlichkeiten nicht.

Für Ewald²⁷⁾ gibt es für L.A. keine obere Altersgrenze. Er hält gerade alte Leute für L.A. besonders geeignet und hat selten üble Folgen bei ihnen beobachtet. Durch die allgemeine Narkose hingegen erleiden sie oft Schaden an ihrem Respirationstrakt oder Zirkulationsapparat.

Wie wir schon sagten, stellen sich bei Anwendung von L.A. bedeutend seltener Lungenkomplikationen ein als bei Inhalationsnarkosen. Diese Erfahrung hat auch Russell⁶²⁾ gemacht. Nur in einem Fall der Operationen unter L.A. stellte sich Pneumonie ein am vierten Tag nach der Operation.

Gegenüber der Leitungsanästhesie bietet die L.A. den Vorteil, daß in Fällen, wo anfänglich nur eine kleine Incision gemacht werden muß (wie bei Appendektomie z. B.) diese, wenn es sich als nötig erweist, sofort vergrößert werden kann.

Schwere Störungen des Herzens, des Kreislaufs, der Nieren, der Leber, Stoffwechselkrankheiten, v. a. Diabetis, Tuberkulose und andere respiratorische Erkrankungen, bei denen Inhalationsnarkose mit großen Gefahren und Schädigungen verbunden ist, lassen sich erfolgreicher und gefahrloser unter L.A. operieren.

Fälle mit akutem Blutverlust und Schockwirkung wie ruptierter Tubalchwangerschaft, perforierter Magenulcus, Milzruptur usw. sind unter L.A. trotz niedrigen Blutdrucks erfolgreich operiert worden.

Ein weiterer Vorteil der L.A. beruht auf ihrer geringen toxischen Wirkung auf Gehirn, Leber, Niere, Lungen, da schon wenige Centigramm der Droge für eine vollkommene und zuverlässige Anästhesie ausreichen.

Bei L.A. ist eine Einschränkung der Nahrungszufuhr unmittelbar nach der Operation nicht in dem Maße erforderlich wie bei Inhalationsnarkose, da nach der Operation kein Brechreiz eintritt. Dies ist besonders günstig bei Patienten in cachektischem Zustand und kleinen Kindern.

Da der Blutdruck bei der Anwendung von L.A. gesenkt wird, treten bei allen Operationen weniger häufig und weniger heftig Blutungen auf. Dies bedeutet sowohl für den Chirurgen, der an

einem relativ blutfreien Operationsfeld arbeiten kann, wie für den Patienten einen großen Vorteil.

Persönliche Erfahrungen mit L.A.

Während meines ganzen Medizinstudiums war ich in der glücklichen Lage, die Sommerferien als Famulus in verschiedenen Brooklyn-New-Yorker Krankenhäusern zu verbringen. Ich lernte dort die Grundlagen der Anästhesie kennen, dadurch, daß ich sie selbst geben durfte oder andere dabei beobachtete. Ich habe viele Äther-, Chlor-Äthyl-, Nitrooxydgas mit Sauerstoff-Narkosen verabreicht. Oft habe ich am Kopfende des Operationstisches gesessen, um während einer Operation unter L.A. den Gesamtzustand und im besonderen den Blutdruck des Patienten zu beobachten. Im Laufe der Zeit kam ich zu der Einsicht, daß die L.A. den Inhalationsmethoden weit überlegen ist, sowohl vom Standpunkt des Arztes wie in Anbetracht der Wirkung auf den Patienten. Natürlich sind bei kleineren Eingriffen Nitrooxydgas und intravenös verabreichtes Evipan der L.A. vorzuziehen.

Ich habe L.A. bei Kindern und bei Erwachsenen jeden Alters miterlebt. Fälle, die durch Lungen-, Herz-, Nieren- und Stoffwechselkrankheiten schwer belastet waren, haben die Operation und die L.A. ausgezeichnet vertragen. Der Allgemeinzustand der Patienten, deren Operation ich miterlebt habe, schwankte zwischen gut bis cachektisch. Es ereignete sich ein Todesfall, bei dem es sich um einen alten Mann in cachektischem Zustand handelte. Die Operation geschah wegen Darmverfchluß, der durch ein Neoplasma der Ileocöcalklappe hervorgerufen worden war. Es war nicht ratsam, den Tumor zu entfernen, da sich Metastasen bis in andere abdominale Gegenden ausdehnten. Während die Haut wieder geschlossen wurde, hörte der Patient auf zu atmen und reagierte trotz aller Maßnahmen — künstliche Atmung, Herzmittel usw. — nicht mehr. Er wäre zweifellos unter jeder Form von Anästhesie gestorben.

Die meisten Patienten fürchten die Narkose mehr als die Operation selbst, vor allem diejenigen, die früher schon einmal eine Inhalationsnarkose durchgemacht haben. Sie sind sehr erleichtert, wenn man ihnen auseinandersetzt, daß sie nur einen Nadelfstich

spüren, daß sie während der Operation ohne Schmerzen fein werden und daß sie danach das Erbrechen und die Übelkeit, die nach Äthernarkose eintritt, nicht erfahren werden. Die beruhigende psychologische Wirkung, welche der operierte Patient auf die übrigen Insassen des Krankensaals hat, ist für die noch bevorstehenden Operationen sehr vorteilhaft. Ich habe mehrfach mit Patienten gesprochen, die beide Narkosearten an sich selbst erfahren haben, und fast alle bevorzugten die L.A. Auch war es für die Patienten sehr angenehm, daß sie unmittelbar nach der Operation leichte Nahrung zu sich nehmen durften, wodurch die Genesung beschleunigt werden konnte. Vor allem fiel das quälende Durstgefühl weg, das sich nach der Inhalationsnarkose einstellt.

In allen Fällen erhielten die Patienten eine Stunde vor der Operation eine Morphin- und Atropininjektion. Wenn die Kranken dann in den Operationsaal gebracht wurden, befanden sie sich in einem Dämmerzustand. Oft konnte ich beobachten, daß sie während der Operation einschliefen oder jedes Interesse an ihrer Umwelt verloren.

Was das bei L.A. immer auftretende Sinken des Blutdrucks anbelangt, so habe ich nie eine Senkung von mehr als 40 mm Hg erlebt; gewöhnlich schwankte der Grad der Senkung zwischen 20 und 30 mmHg. Am Ende der Operation war der Blutdruck beinahe wieder auf die normale Höhe gestiegen. Selbstverständlich wurde in allen Fällen die Trendelenburg-Lage angewandt. Die Höhe der Beckenhochlage war davon abhängig, an welchem Teil des Körpers operiert wurde. Nur wenige Male wurden blutdrucksteigernde Mittel gegeben, und auch dies nur von Chirurgen, die mit L.A. noch wenig Erfahrung hatten.

Sehr selten stellte sich Erbrechen und Übelkeit ein. In den wenigen Fällen, wo Erbrechen zu Beginn der Operation eintrat, war es nur von kurzer Dauer. Es konnte immer durch kleine Gaben von Sauerstoff und Kohlenoxyd beseitigt werden. Zweimal war ich Zeuge schwerer Atemlähmung. Die Patienten wurden sofort in eine verstärkte Trendelenburg-Lage gebracht und mußten Sauerstoff und Kohlendioxyd inhalieren. Außerdem wurde eine Ampulle

Lobelin intravenös injiziert. Es trat eine unmittelbare Reaktion ein, und die Operation konnte ohne Schwierigkeiten fortgesetzt werden.

In fast allen Fällen überdauerte die Anästhesie die Operation. Jedoch war es bei einigen, sich länger hinziehenden Operationen, die länger als zwei Stunden dauerten, nötig, die L.A. durch Nitro-oxydgas zu ergänzen oder eine Lokalanästhesie der operierten Teile vorzunehmen. Dies fand statt bei Fällen, wo mehrere operative Eingriffe unmittelbar nacheinander vorgenommen wurden.

Die meisten der Chirurgen, die ich mit L.A. arbeiten sah, unterfuchten, während der Abdomen geöffnet war, die Gallenblase, den Appendix, die Ureter, Adnexe, den Magen und das Duodenum. Dies geht besonders gut, da der Abdomen bei L.A. völlig entspannt ist. So können auch Erkrankungen an anderen Organen, derentwegen die Operation ursprünglich nicht unternommen wurde, gleich mitbehandelt werden.

Die einzigen Nachwirkungen, die ich miterlebt habe, waren Kopfschmerzen; diese traten gewöhnlich in etwa 10% aller Fälle auf. Meistens reagierten sie auf eine Mischung von Aspirin, Pyramidon und Codein. Wo diese Mittel nicht halfen, konnten die Kopfschmerzen gewöhnlich beseitigt werden durch intravenöse und intramuskuläre Injektion von Magnesiumsulfat (dieser Arbeit). Nicht ein einziges Mal traten neurologische Symptome auf.

Da noch etliche Stunden nach der Operation völlige oder teilweise Empfindungslosigkeit anhält, ist große Vorsicht geboten bei der Erwärmung des Bettes. In einem Fall zog sich durch die Nachlässigkeit einer Krankenschwester ein Patient durch eine Wärmeflasche unmittelbar nach der Operation ziemlich erhebliche Verbrennungen am Bein zu. Bei geschultem Personal ereignen sich solche Zwischenfälle sehr selten.

Am häufigsten wurden Neocain und Procain als Drogen verwandt. Für Operationen bis zum Zwerchfell 0,15 g Neocain, gemischt mit 4 ccm Liquor bis zur völligen Lösung der Droge. Nach der Injektion wurde der Patient auf dem Rücken in Trendelenburg-Lage von ungefähr 20 Grad gebracht. Für Operationen oberhalb des Zwerchfells verwandte man die doppelte Menge der Droge und des Liquors. Bei L.A. mit Procain nahm man 1 g für Beckenopera-

tionen; 1,2 bis 1,5 g für abdominale Eingriffe, für höhere Gegenden wurde die Dosis entsprechend erhöht.

In den New Yorker Krankenhäusern hat sich die L.A. als sehr wertvoll erwiesen und ist die beliebteste und am meisten angewandte Anästhesie bei allen größeren chirurgischen Eingriffen geblieben. In Deutschland wird die L.A. selten angewandt, vielleicht, weil man mit Avertin, Evipan usw. so erfolgreich operiert hat. Andererseits hat man in Amerika nur sehr langsam diese letztere Art der Narkose aufgegriffen.

Zum Schluß sei hier ein Ausspruch Jacksons³⁸⁾ angeführt, in dem der amerikanische Chirurg sich eindrucksvoll für die Anwendung der L.A. einsetzt:

„In meinem beruflichen Leben war ich bestrebt, konservativ zu sein. Nur langsam habe ich neue Methoden aufgegriffen, wenn ihr Wert von Autoritäten dargetan worden war. Wenn ich jetzt auf viele Jahre operativen Arbeitens mit allgemeiner Narkose zurückblicke, kann ich nicht umhin zu empfinden, daß ich heute mit der L.A. meinen Patienten technisch bessere chirurgische Dienste leiste, daß ich durch die Vermeidung von Komplikationen mehr Leben rette als früher.“

Zusammenfassung.

1. Nicht Corning, sondern Bier muß als der Vater der Lumbal-Analgesie anerkannt werden.
2. Durch die Methoden von Pitkin mit Spinocain, von Kirschner mit seiner Anästhesieplombe und durch das neue hochviscotische Pantacoin ist es möglich, eine variable Anästhesie durchzuführen.
3. Die meisten Chirurgen verwenden noch heute die Bier'sche Technik.
4. Blässe, Blutdrucksenkung, Kälte und Schweiß während der Operation sind, wie die Erfahrung zeigt, ziemlich harmlos, solange der Patient in Trendelenburg-Lage sich befindet.

5. Das Sinken des Blutdrucks kann beseitigt werden entweder durch verstärkte Trendelenburg-Lage, wodurch Drainage zum Herzen bewirkt und so Cerebralanämie verhindert wird, oder durch Medikamente wie Eukodal, Ephetonin, Ephedrin und Bazedrin. Diese können den Druck vor oder während der Operation prophylaktisch erhöhen.
6. Fälle mit akutem Blutverlust und entsprechender Blutdrucksenkung sind nicht kontraindiziert.
7. Bei L.A. auftretende Kopfschmerzen können erfolgreich behandelt werden entweder durch intravenöse Infusion physiologischer Kochsalzlösung, oder durch Magnesiumsulfat, als Klysma, intravenös oder intramuskulär verabreicht.
8. Aufgeregte oder psychisch mitgenommene Patienten können unter L.A. operiert werden, wenn man ihnen Amytal- oder Scopolamin-Eukodal-Ephetonin oder Morphinum mit Magnesiumsulfat gibt.
9. Postoperative Lungenkomplikationen treten bei L.A. weniger auf als bei Inhalationsnarkose.
10. Neurologische Komplikationen sind nicht ganz selten, aber meist von vorübergehender Natur.
11. Außer lokalen Infektionen in der Gegend der Punktion und Cerebralneoplasmen bestehen keine Kontraindikationen für L.A. — Auch hohes Alter und Kinder, sowie Patienten in cachektischem Zustand sind nicht kontraindiziert. Ebenso wenig ernste Störungen des Herzens, des Kreislaufs, der Nieren, der Leber wie auch Hyper- und Hypotension.
12. Es ist die Anästhesie der Wahl bei dringenden Unterleibsoperationen wie ruptierte Tubalchwangerschaft, akuter Appendicitis, Darmobstruktion und perforierter Ulcus.
13. L.A. kann als Normal-Anästhesie bei allen Operationen unterhalb des Zwerchfells mit weit größerer relativer Sicherheit ausgeführt werden als die Chirurgen heute noch zu glauben scheinen. —
14. Nachteilig erweist sich die L.A. in Fällen oberhalb des Zwerchfells, Kopf und Hals mit eingeschlossen. Bei Kopfoperationen

sollte nur von Chirurgen mit großer Erfahrung in L.A. diese Methode gewählt werden.

15. In der Gynäkologie kann L.A. als Normal-Anästhesie angewandt werden; in der Geburtshilfe ist ihre Anwendung jedoch nur bei Kaiserschnitt ratsam.
16. Die L.A. bedeutet durch die Schnelligkeit ihrer Wirkung eine große Zeiterparnis. Wenn der Chirurg mit dem Waschen und Desinfizieren fertig ist, ist der Patient schon bereit für die Operation. Durch die Leichtigkeit der Methode wird die Anwesenheit eines geschulten Narkotiseurs hinfällig. Der Chirurg oder sein Assistent können die Narkose selber ausführen.
17. Erbrechen tritt nur zu Anfang der Operation auf, wo der Patient noch am widerstandsfähigsten ist. Nach der Operation stellt sich bei L.A. weder Erbrechen noch Schock ein.
18. Bei eiligen Operationen ergeben sich bei L.A. nicht dieselben Schwierigkeiten, die bei Inhalationsnarkose auftreten, auch wenn der Patient kurz vorher eine Mahlzeit zu sich genommen hat. Unmittelbar von der Straße weg kann der Patient ohne jede besondere Vorbereitung in den Operationsaal gebracht werden.
19. Bei L.A. wird durch den entspannten und ruhigen Zustand der Organe des Abdomens die Operation für den Chirurgen erleichtert.
20. Auf Grund des niedrigen Blutdrucks treten während der Operation nicht so viele Blutungen auf.
21. Jeder Körperteil kann unter L.A. operiert werden. Für Kopf- und Thoraxoperationen ist besondere Erfahrung des Chirurgen erforderlich.
22. Die durch Diffusion der anästhetischen Lösung nach oben zu befürchtende Gefahr der Atemlähmung infolge der Wirkung der Droge auf die Medulla ist unbedeutend.

Zum Schlusse meiner Arbeit ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Professor Dr. Graff herzlich für die Überlassung des Themas zu danken.

Literatur.

1. Adam : Münch. Mediz. Woch. Nr. 81, 1906.
2. Arnold : Nebraska, Med. J., Mai 1932.
3. Averet, Sußmann u. Zimring : Amer. J. obst. and Gyn. Sept. 1932.
4. Babcock : Amer. J. of Surgery. Nr. 5, 1928.
5. Barker : Experiences with Spinal Analgesia in Reference to 254 Cases. — British Med. J. 16. März 1912.
6. Biberfeld : Med. Klinik Nr. 48, 1905.
7. Bier : Dtsch. Zf. f. Chir. April 1899.
- 7^a. — Münch. Med. Wochenschrift. 29. Mai 1906.
- 7^b. — Med. Klinik. Nr. 43, 1906.
8. Bode : Der Chirurg. Heft 8, 1934.
9. Bleffen u. Rygh : Minnesota Med. J. Nr. 12, 1929.
10. Bower : J. A. M. Assoc. 29. Jan. 1933, zit. bei Foß und Schwalm.
11. Broschüre über Pantocain „L“: hsg. durch die J. G.-Farben.
12. Bunus : Southern Med. and Surgery. Nr. 89, 1927.
13. Campbell : J. urology. Sept. 1930.
14. Canny Ryall : The Medical Press 1907, S. 659.
15. Cafe : South; Western Med. J. Nr. 12, 1928.
16. Castro Silva : Arch. de med. de Pernambuco, Brazil 1, 47, 1925.
17. Corning : New York Med. J. 31. Okt. 1885.
18. Cosgrove : Amer. J. of Surgery Nr. 6, 1928.
Amer. J. of obst. and Gyn. Nr. 5, 1931, zit. bei Preis-secker.
19. Crile : Abstr. J. Am. Med. Ass. 25. Nov. 1933.
20. Cutler u. Hunt : Arch. Surgery. 1, 114, 1920.
21. Dean : The Importance of Anaesthesia by Lumbar injection in operations for acute Abdominal diseases. Brit. Med. J. 12. 5. 1906.
22. Deaver u. Eckels : New England J. Med. 16. Okt. 1930.
23. Di Pace : Anaesthesia generale rochicdiano Reforma med. 1920, Nr. 15. — Zentr.-Bl. f. Chir. Nr. 35, 1920.
24. Donitz : Kokainisierung des Rückenmarks unter Verwend-
ung von Adrenalin. Münch. Med. Woch. Nr. 34, 1903.
- 24^a. — Münch. Med. Woch. Nr. 28, 1906.

25. Evans: Spinal Anesthesia, New York, Paul B. Hoeber 1929, S. 126/29, zit. bei Koster und Weintrob.
26. — Spinal Anesthesia. Will. Weinemann, London 1929, zit. bei Preisseecker.
27. Ewald: Wiener Med. Woch. Nr. 19, 1910.
28. Flörcken: Zentralblatt f. Chir. Nr. 29, 1919.
- 28^a. — Zentralblatt f. Chir. Nr. 8, 1935.
29. Foß u. Schwalm: J. Am. Med. Assoc. 25. 11. 1933.
30. Franken: Schmerz Narkose Anästhesie, Heft 1, 1935.
31. Goetz: Brief an Dr. Koster, zit. bei Koster und Weintrob. The Amer. J. of Surgery. Nr. 2, 8. 1930.
32. Gray: Brit. Med. J. 2. Sept. 1911.
33. Hampton: J. Missouri Med. Assoc. Nov. 1932.
34. Harrison: Arch. Surg. Oct. 1930.
25. Hohmeier u. König: Sammelforschung über die L.A. im Jahre 1909. Arch. f. klin. Chir. Bd. 93, 1910.
36. Höfemann: Zentr.-Bl. f. Chir. Nr. 3, 1920.
37. J. of the Royal Army Corps: Vol. XI, Heft 2.
38. Jackson: Spinal-Anaesthesia in Major Surgery. Ann. of Surgery. Febr. 1930.
- 38^a. — Wisconsin Med. J. März 1937.
39. Jafchke: Leistungsfähigkeit der L.A. in der Gynäkologie. Klin. Woch. Nr. 2, 1922.
- 39^a. — Klin. Woch. 8. Jan. 1922.
- 39^b. — Schmerz, Narkose, Anästhesie. Apr.-Heft 1, 1931.
40. Killian: Dtsch. Zschr. f. Chir. Bd. 11, 12, 1932.
41. Kirchner: Zentr.-Bl. f. Chir. Nr. 18, 1919.
- 41^a. — u. Stauß: Beitr. z. willkür. Begrenzung u. z. individuellen Dosierung der L.A. Arch. f. klin. Chir. Bd. 173, 1932.
42. Kozłowski: Zentr.-Bl. f. Chir. 8. Nov. 1902.
43. Koster: Am. J. of Surgery. Nr. 6, Dez. 1928.
- 43^a. — u. Kasman: Surgery, Gyn. and Obstetrics. Nov. 1929.
- 43^b. — — Med. J. and Record. 18. 2. 1931.
- 43^c. — u. Makai: Der Chirurg. Heft 23, 1930.
- 43^d. — u. Scheinfeld: Am. J. f. Obst. and Gyn. July 1935.
- 43^e. — u. Weintrob: Am. J. of Surgery. June 1930.
- 43^f. — u. Wolf: Arch. of otolaryngology. Nov. 1930.
44. Labat: Eliminations of dangers of L.A. Am. J. of Surg. Nr. 5, 1928.
- 44^a. — Nelsons Loose Leaf Living Surg. zit. in Broschüre der Anglo-French Drug Co.
45. Lundy: Med. J. and Rec. Nr. 124, 1926, S. 87/93.

46. Martin u. Arbuthnot: J. Am. Med. Assoc. Nr. 87,
S. 1723/5 1926.
47. McGrath: J. Am. Ass. Nr. 61, 1913.
48. Michelson: Über die Wertlosigkeit des Zusatzes von
Nebennierenpräparaten bei der L.A. Münch. Med. Woch.
Nr. 50, 1907.
49. Morrison: Brit. Med. J. 21. Juni 1913.
- 49^a. — Brit. Med. J. Nov. 1921.
50. Morton: Subarachnoid Injections of Cocain for Operations
in the Upper Part of the Body. Jahresverfamml. d. Am.
Med. Assoc. — J. Am. Med. Ass. 1902.
51. Müllereder: Wiener Klin. Woch. Nr. 3, 1934.
52. Opitz: Münch. Med. Woch. Nr. 18, 1906.
53. Orth: Supplement Am. J. Surg. Nr. 39, 1929.
54. Philippides: Erfahrungen mit der Kirschnerischen Spinal-
anästhesie. Arch. f. klin. Chir. Heft 4, 1935.
55. Philipowicz: Dtsch. Zschr. f. Chir. Nr. 21, 1930.
56. Pitkin: Broschüre über Spinocain. J. G.-Farben.
57. Preisseecker: L.A. i. d. Geburtshilfe u. Gynäkologie
Mandrich. Wien 1934.
58. Quincke: Dtsch. Klin. Bd. VI, 1891.
59. Reber: J. Am. Med. Ass. Nr. 5, 1910.
60. Rodriguez u. Bermejo: Arch. de Cardiologia y Hema-
tologia. Bd. 14, Nr. 10, Okt. 1933.
61. Rolando: Minerva Medica. Nr. 10, 1928.
62. Russell: Am. J. of Surg. Nr. 6, 1929.
63. Sanchis u. Banus: Abstract J. Am. Med. Ass. Nr. 76,
1921.
64. Schmidt: D. Chirurg Heft 18, 1932.
- 64^a. — Zentr.-Bl. f. Chir. Nr. 21, 1932.
65. Schwarz: Wiener Med. Woch. Nr. 48, 1901.
66. Senge: Abstr. J. Am. Med. Ass. Nr. 62, 1914.
67. Sise: New York State J. of Med. 1. Okt. 1929.
68. Sonnenberg: Dtsch. Med. Woch. 2. März 1904, Nr. 9.
- 68^a. — Die Rückenmarksanästhesie mittels Stovocain und Novo-
cain. v. Leuthold-Gedenkschrift 1906.
69. Sonnenschein: Abstr. J. Am. Med. Assoc. Nr. 81, 1923.
70. Sourasky: Brit. Med. J. Nr. 2, 1926.
71. Sten Friberg: Münch. Med. Woch. Nr. 9, 1935.
72. Stolz: Arch. Gyn. 1904 zit. bei Preisseecker.
73. Symonds: Lancet Nr. 1, 1925.
74. Tendler: Memphis Med. J. Nr. 6, 1929.

75. T o v e l l : Preliminary Report on the Use of Benzedrin. Proc. of Staff Meeting of Mayo Clinic Sept. 9, 1936. Modern Medicine. Nov. 1936.
 76. T u f f i e r : Semaine medicale. Nr. 51, 1900.
 77. V a n L i e r : Mitt. a. d. Grenzgebieten d. Med. u. Chir. Nr. 1, 1917.
 78. W a r n e c k e : Zentr.-Bl. f. Gyn. Nr. 49, 1925.
 79. W e r t h e i m e r : Abstr. J. Am. Med. Assoc. Nr. 79, 1922.
 80. W o l f : Berliner Klin. Woch. Nr. 41, 1907.
 81. W r i g h t : Proc. Royal Soc. Med. März 1931.
-

Lebenslauf.

Ich, Raymond Rivkin, wurde geboren am 28. September 1909 in Brooklyn-Newyork als Sohn des Arztes J. G. Rivkin.

Meine Schulbildung erhielt ich in Newyork, wo ich im Sommer 1926 an der Clarkschool die Reifeprüfung ablegte. Anschließend bezog ich die Universität Newyork und 1927 mit Unterbrechungen die Universität von Alabama, College of Arts and Sciences, wo ich das amerikanische medizinische Vorstudium absolvierte.

Vom WS. 1931 an studierte ich Medizin an der Universität Bonn.
